

服用に際しては、説明文書をよく読むこと
【薬効名】ビタミン含有保健薬

第2類医薬品

【販売名】マムシグロンスーパー内服液

【使用上の注意】相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この容器を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感、下痢

2. しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この容器を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】

滋養強壮、虚弱体質、
肉体疲労・病中病後・
食欲不振・栄養障害・
発熱性消耗性疾患・
産前産後などの場合
の栄養補給

【用法・用量】

成人(15歳以上)1日1回
1瓶(100mL)を服用して
ください。

*15歳未満は服用しないこと。

<用法・用量に関連する注意>

◆定められた用法・用量を
厳守すること。



スーパー内服液

第2類医薬品

マムシグロ

【成分・分量】成人1日量(100mL)中
マムシ抽出液(原生薬換算:100mg) 0.5mL、ニンジン
流エキス(原生薬換算:600mg) 0.6mL、ジャシヨ
ウシ流エキス(原生薬換算:200mg) 0.2mL、インヨ
ウカク流エキス(原生薬換算:300mg) 0.3mL、日局
タウリン 2000mg、日局チアミン銅化物(ビタミンB1
硝酸塩) 10mg、日局リボフラビン(ビタミンB2) 3mg、
日局ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6) 5mg、日局ニ
コチン酸アミド 25mg、日局無水カフェイン 50mg
添加物:白糖、ハチミツ、D-ソルビトール液、クエン
酸水和物、カラメル、安息香酸Na、パラベン、エタ
ノール、香料、パニリン(エタノール0.61mL以下)

<成分・分量に関連する注意>

- ◆本剤に配合されているリボフラビン(ビタミンB2)により、尿が黄色くなることがあります。
- ◆本剤に配合されている生薬成分により、混濁又は沈殿を生じることがありますが、品質上問題はありません。よく振ってお飲みください。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる。)

【お客様相談室】電話 06-6131-1300
(祝祭日を除く月～金曜日 10:00～17:00)

【製造販売元】

株式会社 阪本漢法製薬
大阪市北区曾根崎2丁目7番4号

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

100mL 製造番号

S1
ガラス:瓶
金属:キャップ 使用期限

