

この添付文書は、使用前によくお読みください。
また、使用が終わるまで大切に保管してください。

第②類医薬品

鎮咳去痰薬 ペアコール咳止めシロップS

「せき」はのどや気管支の炎症などによって起こります。「せき」が頻発したり、長く続くとのどを痛めたり、声がかれたりします。さらにはそれだけでなく、睡眠をさまたげ、体力を消耗させ、ひいては病気に対する抵抗力を低下させます。ペアコール咳止めシロップSは「せき」の中枢に作用する成分、気管支を拡張させて「せき」をしずめる成分、「たん」をうすめてはき出しやすくする成分などを配合していますので「せき」や「たん」にすぐれた効果を期待できます。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください
(眠気等があらわれることがあります。)
3. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください
4. 過量服用・長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 高齢者。
 - (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (5) 次の症状のある人。
高熱、むくみ、排尿困難
 - (6) 次の診断を受けた人。
心臓病、高血圧、糖尿病、腎臓病、緑内障、甲状腺機能障害、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状	関係部位	症状
皮膚(ふ)	発疹・発赤、かゆみ	精神神経系	めまい
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振	泌尿器	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
偽アルドステロン症 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。
呼吸抑制	息切れ、息苦しさ等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
便秘、口のかわき、眠気
4. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】

せき、たん

【用法・用量】

次の1回量を添付の目盛り付きコップで量り、1日3回毎食後及び必要に応じて、就寝前に服用してください。
また、1日6回まで服用しても支障ありませんが、その場合は約4時間の間隔をおいて服用してください。

年 齢	1 回 量	年 齢	1 回 量
15 歳以上	10mL	3 歳以上 5 歳未満	2.5mL
11 歳以上 15 歳未満	6.5mL	1 歳以上 3 歳未満	2mL
8 歳以上 11 歳未満	5mL	3ヶ月以上 1 歳未満	1mL
5 歳以上 8 歳未満	3mL	3ヶ月未満	服用しないでください

〈用法・用量に関する注意〉

- (1)用法及び用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)12歳未満の小児には、医師の診療を受けさせることを優先してください。

【成分・分量と作用】

1日量(60mL)中

成 分	分量	作 用
ジヒドロコデインリン酸塩	30mg	せき中枢に作用してせきをしずめ、呼吸を楽にします。
<i>dl</i> -メチルエフェドリン塩酸塩	75mg	気管支をひろげて緊張をやわらげ、せきをしずめます。
<i>d</i> -クロルフェニラミンマレイン酸塩	6mg	抗ヒスタミン剤で、アレルギーが原因となって起こるせきをしずめます。
グアヤコールスルホン酸カリウム	270mg	気道粘液の分泌をたかめ、粘りついているたんをうすめてはき出しやすくします。
無水カフェイン	120mg	中枢神経に作用して、他の成分の動きを助けます。
カンゾウエキス (原生薬換算量：2500mg)	625mg	炎症をしずめ、たんをはき出しやすくします。
キキョウエキス (原生薬換算量：1400mg)	350mg	たんをうすめてはき出しやすくします。
セネガ流エキス (原生薬換算量：600mg)	0.6mL	気道粘液の分泌をたかめ、粘りついているたんをうすめてはき出しやすくします。

添加物として、白糖、D-ソルビトール液、エタノール、プロピレングリコール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、クエン酸水和物、クエン酸ナトリウム水和物、安息香酸ナトリウム、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸ブチル、カラメル、香料、パニリン、エチルパニリン、グリセリンを含有します。

〈成分・分量に関する注意〉

本剤は生薬成分を配合していますので、沈殿を生じることがありますが、効果に変わりはありません。よく振って服用してください。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)誤用をさげ品質を保持するため、他の容器に入れ替えないでください。
- (4)使用期限をすぎた製品は服用しないでください。
- (5)服用のつど、ビンの口をよく拭き、フタをしっかり締めておいてください。
- (6)いったん開栓した後は、品質保持の点からなるべく早く服用してください。
- (7)添付の目盛り付きコップはご使用のつど、水洗いなどして常に清潔に保管してください。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は
下記までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

福地製薬株式会社

滋賀県蒲生郡日野町寺尻824

TEL:0748-52-2323

受付時間：9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

製造販売元

福地製薬株式会社

滋賀県蒲生郡日野町寺尻824