

服用前にこの説明書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるように保管してください。

解熱鎮痛薬

トンプククロベ散

第2類医薬品

## ⚠ 使用上の注意

### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないでください  
(1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(2)本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください  
他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬、乗物酔い薬
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください  
(眠気等があらわれることがある。)
4. 服用前後は飲酒しないでください
5. 長期連用しないでください

### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
(1)医師又は歯科医師の治療を受けている人。  
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。  
(3)水痘(水ぼうそう)若しくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある乳・幼・小児(15才未満)。  
(4)高齢者。  
(5)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(6)次の診断を受けた人。  
心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
その他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症、 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
腎障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛（節々が痛む）、下痢等があらわれる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
4. 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

### 効 能

頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・月経痛（生理痛）・外傷痛の鎮痛。悪寒・発熱時の解熱。

### 用法・用量

15才以上（大人） 1回……1包・11才以上15才未満 1回…2/3包  
7才以上11才未満 1回…1/2包・3才以上7才未満 1回…1/3包  
1才以上3才未満 1回…1/4包  
1日1回を限度とし、なるべく空腹時をさけて服用する。

### 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)本剤は、定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

### 有効成分（1日量1包中） 1包量……1,250mg

エテンザミド………500mg・無水カフェイン……… 50mg  
アセトアミノフェン…300mg・プロモバルレル尿素……200mg  
添加物としてパレイショテンブン、無水ケイ酸を含有。

### 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わる）
- (4)1包を分割して服用した残りは、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (5)配置期限のすぎた製品は使用しないでください。



本品についてのお問い合わせは、下記にお願いいたします。  
富山めぐみ製薬株式会社 お客様相談窓口 ☎076 (421) 5531  
受付時間 9:00～17:00（土、日、祝日を除く）



製造販売元

富山めぐみ製薬株式会社

富山県富山市三番町3-10