

第2類医薬品

葛根湯

エキス顆粒



第2類医薬品

葛根湯



エキス顆粒
63包

日本薬局方葛根湯エキスの生薬量最大の25g処方の生薬から抽出して得られた乾燥エキスを全量配合した顆粒剤

第2類医薬品

葛根湯



エキス顆粒

日本薬局方葛根湯エキスの生薬量最大の25g処方の生薬から抽出して得られた乾燥エキスを全量配合した顆粒剤

眠くなる成分は入っていません

体力中等度以上のものの次の諸症：
感冒の初期・鼻かぜ・頭痛・肩こり・筋肉痛・手や肩の痛み

眠くなる成分は入っていません

体力中等度以上のものの次の諸症：
感冒の初期・鼻かぜ・頭痛・肩こり・筋肉痛・手や肩の痛み

【成分・分量】

成人1日量3包(1包3.0g)中
日局 葛根湯エキス 4.34g

成分	分量	成分	分量
日局 カッコン	8.0g	日局 シャクヤク	3.0g
日局 マオウ	4.0g	日局 カンソウ	2.0g
日局 タイソウ	4.0g	日局 ショウキョウ	1.0g
日局 ケイヒ	3.0g	より製した乾燥エキス	

添加物：乳糖水和物、結晶セルロース、ステアリン酸マグネシウム

<成分・分量に関連する注意>

本剤は天然物(生薬)のエキスを用いていますので、顆粒の色調等が多少異なることがあります。

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- 湿気などにより薬が固化することがありますので、1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、速やかに服用してください。
- 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。
お客様相談室 ☎ 06-6423-0565
(祝日を除く月～金曜日10:00～17:00)

【製造販売元】

株式会社 阪本漢法製薬
兵庫県尼崎市名神町1-5-12

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

製造番号



使用期限

4 987076 627132

押して開ける

服用前にこの箱の説明書を必ずお読みください。また、添付文書は挿入しておりますので、必要なときに読めるよう、この箱を大切に保管してください。

【薬効名】 漢方製剤

【販売名】 サカンポー葛根湯顆粒

第2類医薬品

【特徴】

- 「葛根湯」は、体力中等度以上の人の感冒の初期(汗をかいていない人)、鼻かぜ、頭痛、肩こりなどの症状を改善するための処方です。
- 本剤は、「葛根湯」の最大分量の生薬より抽出したエキスを配合した満量処方、飲みやすく服用量を調節しやすい顆粒です。
- 本剤は、眠くなる成分を含みませんので、仕事や車の運転にも支障はありません。

△使用上の注意

❌ **してはいけないこと**

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
次の人は服用しないでください 生後3ヵ月未満の乳児。



■ **相談すること**

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

(1)医師の治療を受けている人。	(7)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。	(8)次の症状のある人。
(3)体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。	むくみ、排尿困難
(4)胃腸の弱い人。	(9)次の診断を受けた人。
(5)発汗傾向の著しい人。	高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
(6)高齢者。	
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

 まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つばり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
- 1ヵ月位(感冒の初期、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には5～6回)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】 体力中等度以上のものの次の諸症：感冒の初期(汗をかいていないもの)、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

【用法・用量】

1日3回食前又は食間に服用してください。 ※食間とは食後2～3時間を指します。 ※微温湯又は水で服用してください。

年 齢	1回量
成人(15歳以上)	1包
7歳以上 15歳未満	2/3包
4歳以上 7歳未満	1/2包
2歳以上 4歳未満	1/3包
2歳未満	1/4包

<用法・用量に関連する注意>

- (1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2)1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させてください。

S3

紙箱 袋:PE、金属