

ビタミン含有保健剤

指定医薬部外品

メルコンSP

特徴

コンドロイチン硫酸エステルナトリウムを配合している**メルコンSP**は健康な生活をおくる為に必要な栄養素である天然型ビタミンE、ビタミンB₁、B₂、B₆、B₁₂を配合したカプセルです。体が疲れている時などは、健康に大切な栄養素が不足しやすくなります。そんな時に**メルコンSP**を服用することで、これらの栄養素を補給し、からだの不調の改善・予防に役立ちます。



使用上の注意

相談すること



- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感、悪心・嘔吐

- しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能又は効果

- 体力、身体抵抗力又は集中力の維持・改善
- 疲労の回復・予防
- 虚弱体質（加齢による身体虚弱を含む。）に伴う身体不調の改善・予防
 - ◆肩、首、腰又は膝の不調◆疲れやすい、疲れが残る、体力がない、身体が重い、身体がだるい◆肌の不調（肌荒れ、肌の乾燥）◆冷えやすい、血行が悪い◆骨又は歯の衰え
- 日常生活における栄養不良に伴う身体不調の改善・予防
 - ◆肩、首、腰又は膝の不調◆疲れやすい、疲れが残る、体力がない、身体が重い、身体がだるい◆肌の不調（肌荒れ、肌の乾燥）◆冷えやすい、血行が悪い◆骨又は歯の衰え◆二日酔いに伴う食欲の低下、だるさ◆目の疲れ
- 病中病後の体力低下時、発熱を伴う消耗性疾患時、食欲不振時、妊娠授乳期又は産前産後等の栄養補給

用法・用量

次の1回量を1日3回朝昼晩服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	2カプセル	3回
15歳未満	服用しないこと	

〔用法・用量に関連する注意〕

※用法・用量を守ってください。(他のビタミン等を含有する製品を同時に使用する場合には過剰摂取等に注意してください。)

成分・分量(1日量6カプセル中)

ベンフォチアミン(ビタミンB₁誘導体).....34.5mg
リボフラビン酪酸エステル(ビタミンB₂).....12mg
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB₆).....10mg
酢酸d- α -トコフェロール(ビタミンE).....100mg
シアノコバラミン(ビタミンB₁₂).....60 μ g
パントテン酸カルシウム.....30mg
アスパラギン酸カリウム・マグネシウム等量混合物.....200mg
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム.....900mg
添加物として、塩酸グルコサミン、ゼラチン、タルク、D-マンニトール、パレイショ
デンプン、ステアリン酸Ca、乳酸Ca、ラウリル硫酸Na、その他4成分を含有する。

〔成分・分量に関連する注意〕

本剤の服用により尿が黄色くなることがありますが、リボフラビン酪酸エステル(ビタミンB₂)によるものですから心配ありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 本品は吸湿性が高いので、ピンのフタのしめ方が不十分な場合、湿気等の影響で成分が変質することがありますので、服用のつどフタをよくしめてください。
- (5) 開栓後は、品質保持の点から、6ヵ月以内にご使用ください。
- (6) 使用期限がすぎた製品は服用しないでください。

