

使用前にこの説明書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

鎮痛・消炎シップ薬 ホットボルテス

24枚入
(6枚×4袋)
第3類医薬品

【特長】

- 粘着力が強く、皮ふにピッタリ良くつきます。
- トウガラシエキスが患部に適度な温感効果をもたらします。
- 皮ふにやさしい弱酸性です。
- 伸縮性タイプの不織布で関節部位の貼付にも便利です。

△【使用上の注意】

⊗ してはいけないこと

【守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります】
次の部位には使用しないで下さい。

(1)目の周囲、粘膜等 (2)湿疹、かぶれ、傷口

■ 相談すること

- 1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
(1)本人又は家族がアレルギー体質の人
(2)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- 2.使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるの
で、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録
販売者に相談して下さい。

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ、はれ、痛み等

3.5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、こ
の文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

【効能・効果】

腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、骨折痛、しもやけ

【用法・用量】

表面のフィルムをはがして、1日1～2回患部に貼付して下さい。

必要な時は、包帯又はテープでとめて下さい。

【用法・用量に関する注意】

- 1.定められた用法・用量を守って下さい。
- 2.体の表面に脂や汗がある場合は、よく拭き取ってから貼付して下さい。
- 3.本剤に触れた手で、目、鼻腔、唇などの粘膜に触れないよう注意して下
さい。

- 4.小児に使用させる場合には、保護者の指導監督の下に使用して下さい。
- 5.本剤の使用により、とくに強いかゆみや痛みが出た場合には直ちにはがし
て、濡れタオルで拭いて下さい。
- 6.入浴に際しては、1時間以上前にはがして下さい。はがした直後に入浴すると
強い刺激を感じることがあります。又、入浴後30分位過ぎてから貼って下さい。
- 7.貼った部分を、コタツや電気毛布等で温めないで下さい。強い刺激を感じる
ことがあります。

【成分・分量】〈膏体100g(1000cm²)中〉

サリチル酸メチル ……………0.5g トウガラシエキス……………0.165g
dl-カンフル ……………0.3g (原薬換算量2.06g)
トコフェロール酢酸エステル……………0.3g

※添加物としてエデト酸Na水和物、メタケイ酸アルミン酸Mg、カオリン、
CMC-Na、ジヒドロキシアルミニウムアミノアセテート、D-ソルビトール、
グリセリン、酒石酸、ポリソルベート80、ラウリン酸ソルビタン、ポリビニル
アルコール、ポリアクリル酸、ポリアクリル酸部分中和物、カルボキシビニル
ポリマー、ヒマシ油を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- 1.直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- 2.使用后は、未使用分を袋に戻し、外気に触れないよう開封口のチャックをきち
んと閉めて保管して下さい。
- 3.小児の手の届かない所に保管して下さい。
- 4.他の容器に入れ替えないで下さい。
【誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。】
- 5.使用期限を過ぎたものは使用しないで下さい。
- 6.開封後は、品質保持の点からなるべく早くご使用下さい。

【包装】24枚入(6枚入×4袋/1枚:10cm×14cm)

製造販売元

株式会社 ミクロ薬品

〒475-0828 愛知県半田市瑞穂町2の6の5

本剤についてのお問い合わせは、下記をお願いします。
株式会社 ミクロ薬品 TEL 0569-32-9450
受付時間(月～金曜日 9:00～17:00 祝祭日を除く)

副作用被害救済制度の問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/>
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)



4 580250 550099

製造番号

使用期限