

第2類  
医薬品

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読み下さい。  
また、必要な時に読めるように大切に保存して下さい。

漢方薬

# 加味逍遙散錠〔大峰〕

## 【使用上の注意】

### 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
  - 医師の治療を受けている人。
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - 胃腸の弱い人。
  - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腸間膜静脈硬化症	長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれる。

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。  
下痢
- 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

\* 5. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

### 【成分・分量】 本品1日量(12錠)中

〔日局〕 ト ウ キ……………1.5g	〔日局〕 ボ タ ン ピ……………1.0g
〔日局〕 シ ャ ク ヤ ク……………1.5g	〔日局〕 サ ン シ シ……………1.0g
〔日局〕 ビ ャ ク ジ ュ ツ……………1.5g	〔日局〕 カ ン ゾ ウ……………0.75g
〔日局〕 プ ク リ ョ ウ……………1.5g	〔日局〕 シ ョ ウ キ ョ ウ……………0.25g
〔日局〕 サ イ コ……………1.5g	〔日局〕 ハ ッ カ……………0.5g

上記生薬より得た加味逍遙散エキス(1/2量)2380mgを含みます。

なお、添加物としてステアリン酸Mg、タルク、クロスカルメロースNa、メタケイ酸アルミン酸Mg、水酸化アルミナマグネシウム、セルロース、乳糖を含みます。

### 【効能・効果】 体力中等度以下で、のぼせ感があり、肩がこり、疲れやすく、精神不安やいらだちなどの精神神経症状、ときに便秘の傾向のあるものの次の諸症：

冷え症、虚弱体質、月経不順、月経困難、更年期障害、血の道症<sup>注)</sup>、不眠症

<sup>注)</sup>「血の道症」とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことです。

### 【用法・用量】 次の量を食前又は食間に水又は白湯にて服用して下さい。(食間とは、食後2～3時間を指します。)

年 齢	1 回 量	1 日 服 用 回 数
成人 (15歳以上)	4 錠	3 回
15歳未満7歳以上	3 錠	
7歳未満5歳以上	2 錠	
5歳未満	服用しないで下さい	

### ＜用法・用量に関連する注意＞

- 用法・用量を厳守して下さい。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

### 【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- 他の容器に入れ替えないで下さい(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります)。
- 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。
- 本剤は天然物を原料としているため、色調、味又は香り等に多少の差異が出るがありますが、効果には変わりありませんので安心して服用して下さい。

### 【お問い合わせ先】

伸和製薬株式会社 情報管理室  
〒116-0003 東京都荒川区南千住5丁目17番8号  
電 話：03 (3807) 3780  
受付時間：9時から17時まで(土・日曜、祝日を除く)

販 売 元 **日邦薬品工業株式会社**  
東京都渋谷区代々木3丁目46番16号  
<http://www.nippo-yakuhin.jp/>



発 売 元 **伸和製薬株式会社**  
東京都荒川区南千住5丁目17番8号



製造販売元 **大峰堂薬品工業株式会社**  
奈良県大和高田市根成柿574番地