


あゆみローヤルゴールド

第3類医薬品

ビタミンB₁・B₆・B₁₂ 製剤

特 徴

●ひざなどの関節痛や腰痛、坐骨、肋間などの神経痛の緩和にフルスルチアミン（ビタミンB₁誘導体）は腸で吸収しやすく、体内で活性型ビタミンB₁に変換され、関節痛、腰痛、神経痛の症状を緩和します。
フルスルチアミンを補助するビタミンB₆、B₁₂をバランスよく配合することで、優れた効果を発揮します。



●眼精疲労に
眼球の水晶体の主原料は、タンパク質の一種で、ビタミンB₆はタンパク質の代謝と免疫機能を高めます。また、ビタミンB₆、B₁は視神経の動きを強化し、ビタミンB₁₂は視神経の機能を正常に保つ働きがあり、効果的に疲労を緩和します。

●肉体疲労時の栄養補給に
三大栄養素（炭水化物、脂質、タンパク質）を効率よくエネルギーに変える助けをし、疲れたカラダを改善します。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
消化器	吐き気・嘔吐、口内炎

2. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 軟便、下痢

3. 1カ月位服用しても症状がよくなる場合も服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

- 次の諸症状の緩和
神経痛、筋肉痛・関節痛（肩・腰・肘・膝痛、肩こり、五十肩など）、手足のしびれ、眼精疲労（慢性的な目の疲れ及びそれに伴う目のかすみ・目の奥の痛み）
「ただし、これらの症状について、1カ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談すること。」
- 次の場合のビタミンB₁・B₆・B₁₂の補給
肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

用法・用量

年 齢	1 回 量
15歳以上	2 錠
7歳以上15歳未満	1 錠
7歳未満は服用しないこと	

いずれも1日1～2回朝夕に服用する。



用法・用量に関連する注意

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。


成分・分量 1日量（4錠中）

成 分	分 量
フルスルチアミン塩酸塩（V.B ₁ 誘導体）	75mg
ピリドキシン塩酸塩（V.B ₆ ）	50mg
シアノコバラミン（V.B ₁₂ ）	1,000μg

添加物としてカルメロース、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、パレイショデンブ、タルク、ヒドロキシプロピルセルロース、沈降炭酸カルシウム、ゼラチン、アラビアゴム末、酸化チタン、精製白糖、ポリビニルアセタールジエチルアミノアセテート、パラフィン、着色料黄色4号（タートラジン）を含む。

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。



お問い合わせ先

連絡先 株式会社ジェイ・メディックス お客様相談室
住 所 福岡県福岡市中央区清川1丁目7-12
大戸ビル5階
電 話 0120-793-044
受付時間 年中無休 9時～17時30分

【発売元】
株式会社ジェイ・メディックス
福岡県福岡市中央区清川1丁目7-12
大戸ビル5階
【製造販売元】
フキ製薬株式会社
奈良県北葛城郡広陵町南郷898

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 <http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai/camp/index.html>
電話：0120-149-931（フリーダイヤル）