

第2類医薬品

# しゃくやくかんぞうとう 芍薬甘草湯

顆粒

満量処方

第2類医薬品

# しゃくやくかんぞうとう 芍薬甘草湯

顆粒

満量処方

日本薬局方 芍薬甘草湯処方最大量12gの生薬より得たエキスを全量配合した満量処方

持ち運びに便利な分包品

体力に関わらず使用でき、筋肉の急激なけいれんを伴う痛みのあるものの次の諸症

こむらがえり、筋肉のけいれん、腹痛、腰痛

第2類医薬品



筋肉の急激なけいれんを伴う痛みのある人のこむらがえり、腹痛、腰痛に

満量処方

顆粒 21包

# しゃくやくかんぞうとう 芍薬甘草湯

日本薬局方 芍薬甘草湯処方の最大量12gの生薬より得たエキスを全量配合した満量処方

体力に関わらず使用でき、筋肉の急激なけいれんを伴う痛みのあるものの次の諸症

こむらがえり、筋肉のけいれん、腹痛、腰痛

S1



4 987076 314452

製造番号

使用期限



袋:PE、金属

紙箱

### 【用法・用量】

1日2~3回服用してください。\*微温湯又は水で服用してください。

年齢	1回量	用法・用量に関連する注意
成人(15歳以上)	1包	(1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。 (2)1歳未満の乳児には、医師の診察を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させてください。
7歳以上 15歳未満	2/3包	
4歳以上 7歳未満	1/2包	
2歳以上 4歳未満	1/3包	
2歳未満	1/4包	

### 【成分・分量】

成人1日量3包(1包2g)中 日局 芍薬甘草湯エキス2.4g

成分	分量
日局 シャクヤク	6g
日局 カンゾウ	6g

より製した乾燥エキス  
添加物:乳糖水和物、パレイシヨテンブ、メタケイ酸アルミン酸Mg、ヒドロキシプロピルセルロース、カルメロースCa、ステアリン酸Mg

### 成分・分量に関連する注意

本剤は天然物(生薬)のエキスをを用いていますので、顆粒の色が多少異なることがあります。

### 【保管及び取扱上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- 湿気などにより薬が固化することがありますので、1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、速やかに服用してください。
- 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

お客様相談室  
☎ 06-6131-1300  
(祝祭日を除く月~金曜日10:00~17:00)

### ■ 製造販売元

株式会社 阪本漢法製薬  
大阪市北区曾根崎2丁目7番4号

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

押して開ける

服用前にこの箱の説明書を必ずお読みください。また、添付文書は挿入してありませんので、必要などきに読めるよう、この箱を大切に保管してください。

【薬効名】漢方製剤

【販売名】阪本漢法の芍薬甘草湯顆粒

第2類医薬品

【特徴】

- 「芍薬甘草湯」は漢方の鎮痛剤といわれ、急激におこる筋肉のけいれんを伴う痛み、こむらがえり、腹痛、腰痛などの症状を改善するための処方です。
- 本剤は「芍薬甘草湯」の1日最大量の生薬より抽出したエキスを配合した満量処方です。
- 本剤は飲みやすく服用量を調節しやすい顆粒で、頓服として用いられます。

### 【使用上の注意】

【してはいけないこと】

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

- 次の人は服用しないでください
  - 生後3カ月未満の乳児。
  - 次の診断を受けた人。心臓病
- 症状があるときのみ服用にとどめ、連用しないでください

相談すること	相対すること										
1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください <ol style="list-style-type: none"> <li>医師の治療を受けている人。</li> <li>妊婦又は妊娠していると思われる人。</li> <li>高齢者。</li> </ol>	(4) 次の症状のある人。むくみ (5) 次の診断を受けた人。高血圧、腎臓病										
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診察を受けてください。	<table border="1"> <thead> <tr> <th>症状の名称</th> <th>症状</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>間質性肺炎</td> <td>階段を上ったり、少し無理をしただけでも息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。</td> </tr> <tr> <td>偽アルドステロン症、ミオパチー</td> <td>手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。</td> </tr> <tr> <td>うっ血性心不全、心室頻拍</td> <td>全身のだるさ、動悸、息切れ、胸部の不快感、胸が痛む、めまい、失神等があらわれる。</td> </tr> <tr> <td>肝機能障害</td> <td>発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。</td> </tr> </tbody> </table>	症状の名称	症状	間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしただけでも息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。	偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。	うっ血性心不全、心室頻拍	全身のだるさ、動悸、息切れ、胸部の不快感、胸が痛む、めまい、失神等があらわれる。	肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
症状の名称	症状										
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしただけでも息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。										
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。										
うっ血性心不全、心室頻拍	全身のだるさ、動悸、息切れ、胸部の不快感、胸が痛む、めまい、失神等があらわれる。										
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。										
3. 5~6回服用しても症状がよくなるない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください											

【効能・効果】体力に関わらず使用でき、筋肉の急激なけいれんを伴う痛みのあるものの次の諸症:こむらがえり、筋肉のけいれん、腹痛、腰痛