

第2類医薬品

# 芍薬甘草湯

顆粒



第2類医薬品



筋肉の急激なけいれんを伴う  
痛みのある方のこむらがえり、  
腹痛・腰痛に

# 芍薬甘草湯

日本薬局方 芍薬甘草湯エキス  
の生薬量最大の  
12g 処方の生薬から抽出して得られた  
エキスを全量配合した顆粒剤



顆粒  
21包

第2類医薬品

# 芍薬甘草湯



顆粒

日本薬局方 芍薬甘草湯エキスの  
生薬量最大の12g 処方の生薬  
から抽出して得られたエキスを  
全量配合した顆粒剤

持ち運びに便利な分包品

体力に関わらず使用でき、筋肉  
の急激なけいれんを伴う痛み  
のあるものの次の諸症

こむらがえり、  
筋肉のけいれん、  
腹痛、腰痛

眠くなる成分は入っていません

体力に関わらず使用でき、筋肉の急激な  
けいれんを伴う痛みのあるものの次の諸症

こむらがえり、筋肉のけいれん、  
腹痛、腰痛

【用法・用量】  
1日2～3回服用してください。

年齢	1回量
成人 (15歳以上)	1包
7歳以上 15歳未満	2/3包
4歳以上 7歳未満	1/2包
2歳以上 4歳未満	1/3包
2歳未満	1/4包

※水かお湯で服用してください。

<用法・用量に関連する注意>

- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させてください。

【成分・分量】

成人1日量3包(1包2g)中  
日局 芍薬甘草湯エキス 2.4g

成分	分量
日局 シャクヤク	6g
日局 カンゾウ	6g

より製した乾燥エキス

添加物：乳糖、バレイシヨテンブ、  
メタケイ酸アルミン酸Mg、  
ヒドロキシプロピルセルロース、  
カルメロースCa、ステアリン酸Mg

※本剤は天然物(生薬)のエキスを  
用いていますので、顆粒の色調  
等が多少異なることがあります。

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- 1包を分割した残りを服用する時には、袋の口を折り返して保管し、速やかに服用してください。
- 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

【お客様相談室】

☎06-6423-0565

(祝日を除く月～金曜日10:00～17:00)

【製造販売元】

株式会社 阪本漢法製薬  
兵庫県尼崎市名神町1-5-12

副作用救済制度 ☎0120-149-931

押して開ける

漢方製剤

第2類医薬品

服用前にこの箱の説明書を必ずお読みください。また、添付文書は挿入しておりませんので、必要なときに読めるよう、この箱を大切に保管してください。

【販売名】 阪本漢法の芍薬甘草湯顆粒

【特徴】

- 「芍薬甘草湯」は漢方の鎮痛剤といわれ、急激におこる筋肉のけいれんを伴う痛み、こむらがえり、腹痛、腰痛などの症状を改善するための処方です。
- 本剤は「芍薬甘草湯」の最大分量の生薬より抽出したエキスを配合した満量処方、飲みやすく服用量を調節しやすい、顆粒の頓服薬です。
- 本剤は眠くなる成分を含みませんので、仕事や車の運転にも支障はありません。

△ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

- 次の人は服用しないでください
  - 生後3ヵ月未満の乳児
  - 次の診断を受けた人：心臓病
- 症状があるときのみ服用にとどめ、連用しないでください

⊗ 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
  - 医師の治療を受けている人
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人
  - 高齢者
  - 次の症状のある人：むくみ
  - 次の診断を受けた人：高血圧、腎臓病
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
うっ血性心不全、心室頻拍	全身のだるさ、動悸、息切れ、胸部の不快感、胸が痛む、めまい、失神等があらわれる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

- 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】 体力に関わらず使用でき、筋肉の急激なけいれんを伴う痛みのあるものの次の諸症：こむらがえり、筋肉のけいれん、腹痛、腰痛



4 987076 314452

製造番号

使用期限



袋：PE、金属



箱

S3