

服用するときは、この説明文書を必ずお読みください。  
又、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

第3類医薬品

大腸のバランスを整え、正常な働きを促す

健胃生薬配合  
整腸薬

# ラクサレット®

「ラクサレット」は、善玉菌の腸内細菌である乳酸菌〔コンクビオゼニン(フェカリス菌)〕と有益な腸内細菌の増殖を促す納豆菌〔ビオナットミン〕と蠕動運動を促進する酪酸菌を主成分としています。3種の生菌に加え、消化を助ける酵素〔ビオチアスターゼ2000〕、胃腸の粘膜を修復する粘膜修復剤〔アカメガシワエキス〕、胃の働きを高める健胃生薬〔センブリ末、ガジュツ末、ケイヒ末〕、乳酸菌の生育を促すビタミン〔ニコチン酸アミド〕、お腹のハリを抑える消泡剤〔ジメチルポリシロキサン〕が配合されており、お腹の調子を整え、日頃乱れがちな便通を改善します。

## ⚠ 使用上の注意



### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

#### 1. 次の人は服用しないでください。

牛乳によるアレルギーを起こしたことがある人。



#### 相談すること

#### 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

(1) 医師の治療を受けている人。

(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(3) 次の診断を受けた人。

○甲状腺機能障害

(4) 抗凝固剤「ワルファリンカリウム」を服用している人。

#### 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮 心	発疹・発赤、かゆみ

#### 3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

○便秘、下痢

#### 4. 2週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。



## 【効能・効果】

整腸(便通を整える)、軟便、便秘、胃部・腹部膨満感、消化不良、もたれ、胃弱、食欲不振、食べ過ぎ、飲み過ぎ、はきけ、嘔吐、胸やけ、胸つかえ

## 【用法・用量】

次の量を食後に水又はお湯で服用してください。〈用法・用量に関連する注意〉

年 齢	1回服用量	1日服用回数
大人(15歳以上)	3錠	3回
11歳以上15歳未満	2錠	
11歳未満	服用しないこと	

- 定められた用法、用量をお守りください。
- 11歳以上15歳未満の小児に服用させる場合は、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- 本剤がのどにつかえることのないよう、よく注意してください。

成分・分量、保管及び取扱い上の注意、お問い合わせ先については、裏面をよくご覧ください。

**【成分・分量】** 9錠(大人1日量)中

成分	分量	作用
酪酸菌	100mg	胃酸に強い善玉菌で、乳酸菌の増殖を助けます。
ピオナツトミン(納豆菌)	50mg	乳酸菌の増殖を助け、整腸作用を示します。
コンクピオゼニン(乳酸菌)	100mg	乳酸を産生し、有害菌の発育を抑えます。
ピオチアスターゼ2000	30mg	主に炭水化物の消化異常の状態を改善します。
ニコチン酸アミド	5mg	乳酸菌又は乳酸生成菌の生育を助けます。
沈降炭酸カルシウム	300mg	胃酸を中和して、胃酸に弱い乳酸菌をまもりま
炭酸マグネシウム	300mg	
センブリ末	30mg	弱った胃の働きを高めま
ガジュツ末	30mg	
ケイヒ末	30mg	
アカメガシワエキス	63mg	胃腸の粘膜を修復し、胃腸機能を整えます。
ジメチルポリシロキサン	90mg	胃腸管内のガスを除去し、胃部・腹部膨満感を改善します。

〔添加物〕アメ粉、クロスカルメロースNa、軽質無水ケイ酸、結晶セルロース、ステアリン酸Mg、*l*-メントール

〈成分・分量に関する注意〉

コンクピオゼニン(乳酸菌)の製造工程中で使用した「脱脂粉乳」が残存しております。

**【保管及び取扱い上の注意】**

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になり、品質が変わります。)又、本剤の容器に本剤以外のものを入れないでください。
4. 容器のフタのしめ方が不十分な場合は、湿気などの影響により本剤が変質するおそれがありますので、服用後はそのつど必ずフタをしっかりとめてください。
5. 本剤にぬれた手で触れないでください。又、手にとった錠剤を元の容器にもどしますと、他の錠剤に影響を与えることがありますので、もどさないでください。
6. 容器の中の詰め物は、輸送中に本剤が破損するのを防止するために入れてありますので、開封した時に捨ててください。
7. 容器の中に乾燥剤を入れてありますので、薬を使い終わるまでは捨てないでください。また、間違っても服用しないよう注意してください。
8. 錠剤の茶褐色～黒褐色の斑点は成分によるもので、品質には問題ありません。又、生薬などが配合されていますので、特有のにおいがあります。
9. 使用期限の過ぎた製品は服用しないでください。
10. 外箱と容器の「開封年月日」記入欄に、開封した日付を記入してください。
11. 一度開封した後は、品質保持の点からなるべく早く服用してください。
12. この説明文書には、本剤を服用するときに必要な注意事項などが記載されていますので、服用が終わるまで本剤とともに外箱に入れて保管してください。



説明文書はいつでも読めるように外箱に保管

**お問い合わせ先**

- お買い求めの薬局、薬店
- 京都薬品ヘルスケア株式会社  
〒604-8444 京都市中京区西ノ京月輪町38番地 TEL.075-803-1078  
受付時間：9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

®：登録商標

発売元 **京都薬品ヘルスケア株式会社**  
京都市中京区西ノ京月輪町38番地

製造販売元 **京都薬品工業株式会社**  
京都市中京区西ノ京月輪町38番地