

肩・腰・関節の

痛みに

ジクロフェナクナトリウム配合



開封口

ご使用に際して、このケースの記載内容を必ず読んでください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

[販売名] スナップキンDFクールゲル
<経皮鎮痛消炎剤>

特徴

- スナップキンDFクールゲルはジクロフェナクナトリウムを配合した非ステロイド系の鎮痛消炎剤です。
- ジクロフェナクナトリウムは、痛みのもととなるプロスタグラジンの生成を抑制し、痛みをやわらげます。
- l-メントール配合により、塗擦後心地よい清涼感があります。

保管及び取り扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)火気には近づけないでください。また、使用後は火中に投じないでください。
- (3)小児の手の届かない所に保管してください。
- (4)合成樹脂を軟化せたり、塗料を溶かしたり、物質を変色させるおそれがあるので付着しないように注意してください。
- (5)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (6)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく速やかに使用してください。

本剤について、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただけますようお願い申し上げます。

消費者相談窓口:

協和薬品工業株式会社 お客様相談室

☎ 058-246-8771

受付時間 9:00~12:00・13:00~17:00
(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度の問合せ先
(独) 医薬品医療機器総合機構

http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

☎ 0120-149-931(フリーダイヤル)

火気厳禁

第二石油類 危険等級Ⅲ
(エタノール、マクロニール)

製造 協和薬品工業株式会社
販売元 岐阜県岐阜市野一色二丁目8番6号

セルフメディケーション

税控除対象

50g



4 962307 091074

成分・分量 (100g中)

成分	分量	はたらき
ジクロフェナクナトリウム	1.0g	痛みのもととなるプロスタグラジンの生成を抑制し、痛みをやわらげます。
l-メントール	3.0g	清涼感を与え、痛みをやわらげます。

添加物として、マクロゴール、エタノール、ヒドロキシ酸ナトリウム、ヒプロロース、ヒドロキシエチルセルロース、乳酸、疎水化ヒドロキシプロピルメチルセルロースを含有します。

効能・効果

腰痛、肩こりに伴う肩の痛み、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

用法・用量

1日3~4回適量を患部に塗擦してください。ただし、塗擦部位をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください。なお、本成分を含む他の外用剤を併用しないでください。

〈用法・用量に関する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 本剤は、痛みやはれなどの原因となっている病気を治療するのではなく、痛みやはれなどの症状のみを治療する薬剤ですので、症状がある場合だけ使用してください。
- (3) 本剤は外用のみ使用し、内服しないでください。
- (4) 1週間あたり50gを超えて使用しないでください。
- (5) 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合は、眼科医の診療を受けてください。
- (6) 使用部位に他の外用剤を併用しないでください。
- (7) 通気性の悪いもの(ラップフィルム、襦袢ベルト等)で使用部位を覆い、密封状態にしないでください。
- (8) 使用後は手を洗ってください。

第2類医薬品

50g



痛みに

ジクロフェナクナトリウム配合

効きめの成分が
直接浸透

スナップキンDF
クール
ゲル
l-メントール配合

チューブタイプ



上段: 使用期限、下段: 製造番号

使用上の注意

【】してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起ります)

1.次の人は使用しないでください。

(1)本剤又は本剤の成分によいアレルギー症状を起こしたことのある人。

(2)ぜんそくを起こしたことのある人。

(3)妊婦又は妊娠していると思われる人。

(4)15歳未満の小児。

2.次の部位には使用しないでください。

(1)目の周囲、粘膜等。

(2)皮膚の弱い部位(顔、頭、わきの下等)。

(3)湿疹、かぶれ、傷口。

(4)みずもつしむしめ等又是化している患部。

3.本剤を使用している間は、他の外用鎮痛消炎剤を使用しないでください。

4.長期連続使用しないでください。

相談すること

1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者が相談してください。

(1)医師、薬剤師の治療を受けている人。

(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(3)次の薬の投与を受けていない人。ニコキソソリ系抗凝剤

2.使用中又は使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるもので、直ちに使用を中止し、このケースを持つて医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤・かゆみ、かぶれはれ、痛み、刺激感、熱感、皮膚のあらぬ落屑(フケ・アカ)のような皮膚のほか、水疱、色素沈着等があらわれます。

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック(アーフィラキシー)	使用をすぐく皮膚のゆみ、じんましやか、声のかすれ、しゃみのどのゆみ、かゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれます。

塗擦部位に強いゆみを伴う発疹・発赤・はれ、刺激感、皮膚・ただ等の激しい皮膚炎や色素沈着、白斑があらわれ、中には発疹・発赤・かゆみ等の症状が全身に広がることがあります。

また、日々があるたれた部位に垂垂があらわれたり、感覚がふけることがあります。

3.5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、このケースを持つて医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。