

第2類医薬品

滋養強壮、肉体疲労時の栄養補給

50mL

販売名:ピタグルコンエースD

【使用上の注意】【相談すること】

しばらく服用しても症状がよくなり
ない場合は服用を中止し、この製品
を持って医師、薬剤師又は登録販売
者に相談すること

【効能・効果】


●滋養強壮●虚弱体質●肉体疲労・
病中病後・食欲不振・栄養障害・
発熱性消耗性疾患・産前産後などの
場合の栄養補給

【用法・用量】

成人(15歳以上)1日1回1本(50mL)
を服用する。
・用法及び用量を厳守すること。

ピタグル コン エースD

牛黄・人參・淫羊藿



【成分・分量】1日量(1本:50mL)中

グルクロノラクトン	300mg
ニンジンエキス(人參)	55mg
(日局ニンジン610.5mgに相当)	
ゴウチンキ(牛黄)	200μL
(日局ゴウチン2mgに相当)	
イカリソウエキス(淫羊藿)	30mg
(日局インヨウカク300mgに相当)	
ロクジョウチンキ	100μL
(ロクジョウ30mgに相当)	
シベットチンキ	30μL
(シベット3mgに相当)	
日局チアミン塩化物塩酸塩	10mg
日局リボフラビン	2mg
日局ピリドキシン塩酸塩	5mg
日局ニコチン酸アミド	20mg
日局無水カフェイン	50mg
(アルコール含有0.5mL以下)	

添加物としてクエン酸、DL-リンゴ酸、L-グル
タミン酸Na、白糖、ブドウ糖果糖液糖、D-ソ
ルビトール、安息香酸Na、パラベン、アルコール
L、香料、プロピレングリコール、グリセリン、パ
ニンリン、エチルパニンリンを含有します。

- ・本剤に配合されているリボフラビンにより、尿が黄色になることがあります。
- ・生薬成分を含むため、まれに沈澱を生じることがありますが、薬効には支障ありません。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
 - (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
 - (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になつたり品質が変わる。)
 - (4) 使用期限の過ぎた製品は服用しないこと。
- 副作用被害救済制度 ☎0120-149-931



製造販売元 **Rinyo** 金陽製薬株式会社
奈良県五條市住川町1420番地
Tel. 0747-22-3451

ガラス:ビン、金属:キャップ ¥500+税

使用期限

Lot No.