

ご使用に際して、この説明書を必ず読んで下さい。
また、必要な時に読めるよう本剤とともに保存して下さい。

T-155B

第2類医薬品

はんげこうぼくとう

半夏厚朴湯エキス顆粒KM

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
次の人は服用しないこと
生後3ヵ月未満の乳児。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1)医師の治療を受けている人。
(2)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 1ヵ月位(つわりに服用する場合には5～6日間)服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

〔効能又は効果〕

体力中等度をめやすとして、気分がふさいで、咽喉・食道部に異物感があり、ときに動悸、めまい、嘔気などを伴う次の諸症：不安神経症、神経性胃炎、つわり、せき、しわがれ声、のどのつかえ感

〔用法及び用量〕

食間に服用する。

年 齢	1回量	1日服用回数
大人(15歳以上)	2.5g	3回
小児 15歳未満 7歳以上	1.6g (約2/3匙)	
7歳未満 4歳以上	1.2g (約1/2匙)	
4歳未満 2歳以上	0.8g (約1/3匙)	
2歳未満	0.6g (約1/4匙) 以下	

〈用法及び用量に関連する注意〉

- (1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- (2)1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合のみ服用させること。

〔成分及び分量〕 1日量(7.5g)中

半夏厚朴湯エキス		2.50g
〔日本薬局方	ハンゲ	6.0g〕
〔日本薬局方	プクリョウ	5.0g〕
〔日本薬局方	コウボク	3.0g〕
〔日本薬局方	ソヨウ	2.0g〕
〔日本薬局方	ショウキョウ	1.0g〕

添加物として、乳糖、ステアリン酸マグネシウムを含有する。

○本剤は天然の生薬から有効成分を抽出した製剤ですので、製品により顆粒剤の色・風味が若干異なることがあります。薬効には変わりありません。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

〔お問い合わせ先〕

一元製薬株式会社「お客様相談室」

〒171-0043 東京都豊島区要町3-4-10

電話：03-3973-2917

○受付時間：9:00～17:00(土、日、祝祭日を除く)

発売元 **一元製薬株式会社**
東京都豊島区要町3-4-10

製造販売元 **北日本製薬株式会社**
(輸入元) 富山県中新川郡上市町若杉55