

ご使用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

にきび、吹き出物治療薬
イハダ アクネキュアクリーム

第2類医薬品



IHADA
顔の肌トラブル治療薬

W効果処方

2つの有効成分が、にきび、吹き出物を効果的に治療します。

抗炎症成分

イブプロフェンピコノールが、アクネ菌によるコメドの生成を抑え、炎症を鎮めます。

殺菌成分

イソプロピルメチルフェノールが、症状を悪化させるアクネ菌などを殺菌します。

正常な皮膚



にきび、吹き出物のはじまり



コメド：毛穴に皮脂や角質がまった状態

にきび、吹き出物



- ノンステロイド ○お肌にやさしい弱酸性
- のびがよくべたつかないクリームタイプ ○さわやか微香性

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

次の部位には使用しないでください。

目や目の周囲



相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 葉などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (3) 患部が広範囲の人
 - (4) 湿潤やただれのひどい人
 - (5) 深い傷やひどいやけどの人
- 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、刺激感(ヒリヒリ感)、はれ(腫脹)、乾燥化(つっぱり感)

- 1ヶ月くらい使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

〔成分・分量〕

成 分	分量(1g中)	作 用
イブプロフェンピコノール	30mg	アクネ菌によるコメダの生成を抑え、炎症を鎮めます。
イソプロピルメチルフェノール	3mg	症状を悪化させるアクネ菌などを殺菌します。

添加物として、ラウリン酸マクロゴール、チオ硫酸Na水和物、エドト酸Na水和物、パラベン、カルボキシビニルポリマー、ジイソプロパノールアミン、オクチルドデカノール、香料を含有します。

〔適応症〕にきび、吹き出物

〔用法・用量〕1日数回、石けんで洗顔後、適量を患部に塗布してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 本剤はにきび、吹き出物のある部位のみに使用し、周辺の広い部分には使用しないでください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 本剤は外用にのみ使用してください。

〔保管および取扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください(誤用の原因になったり、品質が変わる場合があります)。
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、一度開封した後はなるべく早く使用してください。

お問い合わせ先 資生堂薬品株式会社
お客さま窓口 03-3573-6673 受付時間 9:30~17:00(土、日、祝日を除く)

発売元 資生堂薬品株式会社 東京都中央区銀座7-5-5
製造販売元 万協製薬株式会社 三重県多気郡多気町五柱1169-142

SHISEIDO

チューブ穴のあけ方

キャップを逆にして、チューブの口元に強く押し当ててください。

