

【成分・分量】1日量1本(50mL)中
トコフェロール酢酸エステル50mg、
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム
120mg、リポフラビンリン酸エス
テルナトリウム5mg、ピリドキシン塩酸
塩5mg、ニコチン酸アミド20mg、タ
ウリン500mg、L-アルギニン塩酸塩
50mg 添加物:白糖、D-ソルビトール、
クエン酸Na水和物、クエン酸水和
物、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油
60、安息香酸Na、カラメル、パラベ
ン、香料、エタノール、プロピレングリ
コール、ミツロウ、エチルパニコリン、グリ
セリン、バニリン、ベンジルアルコール
〔アルコール0.1mL以下〕

●本剤に配合されているリポフラ
ビンリン酸エステルナトリウムに
より、尿が黄色になることがある。

【用法・用量】成人(15歳以上)1日
1回1本(50mL)を服用する。

●用法・用量を厳守すること(他
のビタミン等を含む製剤を
同時に使用する場合には過剰摂
取等に注意すること)。●本剤は、
まれに沈殿や浮遊物を生じること
がある。よく振って服用すること。

発売元 **イオン株式会社**
千葉県千葉市美浜区中瀬 1-5-1

●トップバリュお客さまサービス係
TEL.0120-28-4196
(10~17時:日曜日を除く)

製造販売元 **田村薬品工業株式会社**
奈良県御所市西寺田50



コンドロイチン& ビタミンE タウリン[®]ドリンク

指定医薬部外品

ビタミン
E

コンド
ロイチン

ビタミン
B₂・B₆

50mL カロリー 27 kcal

販売名: **リキtasCOVE** ミックスフルーツ風味

【使用上の注意】 **相談すること** 次の場合は、
直ちに服用を中止し、この製品を持って医
師又は薬剤師に相談すること(1)本剤の服
用により、胃部不快感、下痢、発疹等の症状
があらわれた場合。(2)しばらく服用しても
症状がよくなる場合。

【効能・効果】 滋養強壮、虚弱体質、肉体疲
労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消
耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給

**【保管及び取扱い上の
注意】** (1)直射日光の
当たらない涼しい所に
保管すること。(2)小児
の手の届かない所に保
管すること。(3)他の容
器に入れ替えないこと
(誤用の原因になったり
品質が変わる)。(4)使
用期限を過ぎた製品は
服用しないこと。(5)加
温、冷凍はさけること。

●包材の材質/ピン:
ガラス、キャップ:アル
ミニウム、ラベル:紙

AL01

使用期限

製造番号

注意

●キャップを矢印とは逆に回さないでください。
●ピンはワシモノです。取扱いにはご注意ください。



4 549741 037532