

効能 蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ツツガムシの忌避

有効成分(原液100mL中) ディート 30.0g

添加物: 1,3-ブチレンジクロール、二酸化ケイ素、ポリソルベート60、エタノール、香料。噴射剤: LPG

保管及び取扱い上の注意 ●直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。●小児の手のとどかない所に保管すること。●缶のさびを防ぐため、水廻りや湿気の多い場所に置かないこと。●次の物には付着させないこと。(変質する場合があります) ●小児の食器、玩具、床や家具などの塗装面、メガネ、時計、アクセサリ類、プラスチック類、繊維製品、皮革製品、マニキュア等。●捨てる時は、火気のない屋外で噴射音が消えるまでガスを抜くこと。●使用期限(缶底面に記載)を過ぎた製品は使用しないこと。


火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。

- ①炎や火気の近くで使用しないこと。
- ②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
- ③高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所やストーブ、コンロ等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。
- ④火の中に入れてはいけないこと。
- ⑤使い切って捨てること。

高圧ガス: LPガス

ガス抜きキャップ付き<ガス抜き注意> ●中身を使い切ってから、火気のない屋外で行うこと。●本品のキャップ以外は使用しないこと。●中身が残っている場合、液の飛散により周囲が汚れることがあるので、差し支えない所で行うこと。●人にかからないように注意すること。●ガス抜きの方法 ●①図のようにボタンをつまむ。②つまんだままボタンを押し、時計回りに90度まわす。●噴射音が完全に消えるまで行うこと。●廃棄の際は市町村等で定められた方法に従うこと。●排出を止める場合は、ボタンを元の位置に戻すこと。



外装フィルム、安全カバー、キャップ、ボタン

製造 **muhi** 株式会社 池田模範堂
販売元 富山県中新川郡上市町神田16番地

お客様相談窓口 ☎076-472-0911 (平日9:00~17:00)

muhi

医薬品

虫よけ成分 **30%** 配合

さらっと
パウダー
in

ムヒの 虫よけ ムシペール®PS 30



200mL
第2類医薬品

販売名: ムヒの虫よけムシペールPS30 [第2類医薬品]

使用方法 ●初めて使用する時は、キャップ上部の安全カバーを取り除くこと。●使用前に缶を5~10回程度振って、腕、足などには約15cmの距離から噴霧すること。●噴霧気体を直接吸入しないように注意すること。●冷えて痛くなることがあるので、同じ箇所に連続して3秒以上噴霧しないように注意すること。●用法・用量 ●蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)の忌避のために使用する場合は、適量を肌の露出面にまんべんなくスプレーする。顔、首筋には、適量を手のひらに一度スプレーしてから肌に塗布する。●ツツガムシの忌避のために使用する場合は、適量を肌の露出面及び履物やズボンの裾等にまんべんなくスプレーする。顔、首筋には、適量を手のひらに一度スプレーしてから肌に塗布する。

用法・用量に関連する注意 ●本品はディートの濃度が高いので、12歳未満の小児には使用しないこと。●本剤は吸血害虫に対する忌避剤であって、疾病の治療薬ではない。●本剤は外用にのみ使用し、内服しないこと。●定められた用法・用量を厳守すること。●漫然とした使用を避け、蚊、ブユ(ブヨ)等が多い屋外での使用等、必要な場合にのみ使用すること。●目に入った、飲んだり、なめたり、吸い込んだりすることがないようにし、塗布した手で目をこすらないこと。●万一目に入った場合には、すぐに大量の水又はぬるま湯でよく洗い流すこと。また、具合が悪くなる等の症状が現れた場合には、直ちに、本剤にディートとエタノールが含まれていることを医師に告げて診療を受けること。●目や口の周囲、粘膜や傷口など肌の弱い部分には使用しないこと。誤ってかかった場合は、直ちに水でよく洗うこと。●万一肌に異常を感じたときは、直ちに使用を中止すること。●本品の1回使用による忌避効果の持続時間は、概ね5~8時間である。●本品を噴霧又は塗布した後は、経過時間や使用時の使用者の発汗等の状況を踏まえて、適宜、本品を再度使用すること。●ツツガムシに対する忌避効果は認められているが、薬剤だけに頼らず、シャツ、ズボン、長靴などを使用し、肌を露出しないようにすること。●ツツガムシは見えないので、生息していそうな場所に立ち入る前に塗布すること。●シャツ、ズボン等の衣服に噴霧する場合、繊維の種類によっては本剤により変質する場合があります。合成繊維は変質しやすいので注意すること。●ストッキングなどの上に直接噴霧しないこと。(生地が傷む場合があります。)

使用上の注意 **してはいけないこと** (守らないと副作用が起こりやすくなる) 次の部位には使用しないこと **創傷面、目の周囲、粘膜等 相談すること**
1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること (1) 医師の治療を受けている人。(2) 薬などによりアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。(3) 湿疹やただれのある人。2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに使用を中止し、この製品をもって医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 皮膚: 発疹・発赤、かゆみ、はれ等

内容量 200mL 第一石油類 80mL 火気厳禁 TSO1
®登録商標 副作用被害救済制度 ☎0120-149-931