

ご使用に際して、この説明書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないこと
本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 次の部位には使用しないこと
(1)目の周囲、粘膜等
(2)湿疹、かぶれ、傷口

🗨 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、痛み

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】

腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ、骨折痛

【用法・用量】

1日数回、適量を患部に塗布して下さい。

(用法・用量に関連する注意)

- (1)用法・用量を守ること
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること
- (3)目に入らないよう注意すること。
万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。
なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること
- (4)外用にのみ使用すること
- (5)入浴する1時間前からは使用しないこと。また、薬剤が肌に残っている場合、入浴時や汗をかいた時には、強い刺激を感じることもある
- (6)薬剤塗布後の患部をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないこと
- (7)皮膚の弱い方は、同じ所に続けて塗布しないこと
- (8)同じ部位に他の外用剤との併用は避けること
- (9)使用後は手を洗うこと

【成分・分量】(100g中)

成分	分量
サリチル酸グリコール	10.0g
ノニル酸ワニリルアミド	0.025g
クロルフェニラミンマレイン酸塩	0.1g
トーメントール	2.0g

添加物：マクロゴール、プロピレングリコール、クエン酸水和物、エタノール 含有



4 987450 002562

販売名：サンツールGL液

第3類医薬品 内容量

02 100mL



外用鎮痛消炎剤

サンツールGL液

肩こり

腰痛

筋肉痛



【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所にキャップをしっかり閉めて保管すること
- (2)小児の手の届かない所に保管すること
- (3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり、品質が変わることがある)
- (4)火気に近づけないこと
- (5)火の中に投じないこと
- (6)本剤のついた手で、目の粘膜に触れないこと
- (7)メガネ、時計、アクセサリー等の金属類、繊維の衣類、プラスチック類、床や家具等の塗装面等に付着すると変質又は変色することがあるので、付着しないように注意すること
- (8)本剤が衣類や寝具等に付着し、汚れた場合にはなるべく早く水か洗剤で洗い落とすこと
- (9)使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く使用すること

—お客様ご相談窓口—

お買い求めのお店又は下記窓口まで
東和製薬株式会社(お客様相談窓口)
電話 0120-108-871
受付時間 9:00～17:30
(土・日・祝日を除く)

火気厳禁

第二石油類 危険等級Ⅲ 水溶性
エタノール含有物 100mL

副作用被害救済制度
電話：0120-149-931

製造販売元

東和製薬株式会社
和歌山県紀の川市貴志川町丸呑1229番地

第3類医薬品

100mL