

ご使用に際して、この添付文書をよくお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

第3類医薬品



関節痛 神経痛 肩こりに

コンドロビー-MX (ビタミンB₁主薬製剤)

コンドロイチン・ビスベンチアミン・γ-オリザノール配合

〔特徴〕

- 軟骨由来成分コンドロイチン硫酸エステルナトリウムと3種類のビタミンに、γ-オリザノールを配合した関節痛などを緩和する内服薬です。
- コンドロイチン硫酸が関節軟骨などに、3種類のビタミンが神経や筋肉組織の新陳代謝に、γ-オリザノールが自律神経に働きます。
- 腰痛、関節痛、神経痛などのつらい痛みにも、コンドロビー-MXはからだの中からじんわりと効いてきます。
- 微黄白色の素錠です。



使用上の注意

相談すること



1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1)医師の治療を受けている人。
(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感、吐き気・嘔吐、食欲不振、 腹部膨満感


3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
便秘、軟便、下痢
4. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

〔効能・効果〕

- 次の諸症状の緩和：神経痛、筋肉痛・関節痛（腰痛、肩こり、五十肩など）、手足のしびれ、便秘、眼精疲労
- 脚気
「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談してください。」
- 次の場合のビタミンB₁の補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時



肩こり



腰痛



手足のしびれ

(必ず裏面もお読みください)

〔用法・用量〕

次の量を水又はお湯で服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15才以上)	2錠	2回(朝・晩) ～3回(朝・昼・晩)
15才未満	服用しないでください。	

〈用法・用量に関連する注意〉

●定められた用法・用量を守ってください。

〔成分〕 1日量(6錠)中

成分	分量	はたらき
コンドロイチン 硫酸エステルナトリウム	900mg	軟骨組織を保護し、関節部で発生する痛みを緩和します。
ビスベンチアミン (ビタミンB ₁ 誘導体)	25mg	神経や筋肉組織の新陳代謝を促して、肩こりや腰痛などの症状を緩和します。
パントテン酸カルシウム	20mg	糖や脂質の代謝において、重要な働きをしています。
ビタミンEコハク酸 エステルカルシウム	50mg	血液循環を改善して、肩こりや手足のしびれなどの症状を緩和します。
ガンマ-オリザノール	10mg	米ヌカ由来の成分で、自律神経の調節を助けます。

添加物：イノシトール、結晶セルロース、軽質無水ケイ酸、カルメロースカルシウム、ステアリン酸マグネシウム、アメ粉

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)本剤は湿気を吸いやすいので、服用のつど瓶のフタを十分にしめてください。しめ方が不十分ですと湿気などのため変質することがあります。また、本剤をぬれた手で扱わないでください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

ゼリア新薬工業株式会社 お客様相談室 電話 03-3661-2080
〒103-8351 東京都中央区日本橋小舟町10-11
受付時間 9:00～17:50(土・日・祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

コンドロピーはゼリア新薬工業株式会社の登録商標です。



製造販売元

ゼリア新薬工業株式会社

東京都中央区日本橋小舟町10-11