

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

第2類医薬品



痔疾用剤

痔光軟膏

■外用痔疾用薬 ■販売名：痔光軟膏

痔光軟膏は、痔による痛み・かゆみ・はれ・出血を緩和する紫色をした軟膏剤です。この紫色は生薬である紫根(シコン)の有効成分のアセチルシコニン及びシコニンであり、肉芽増殖を促進し、創傷治癒を促進する作用があります。

！ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください  
(1) 医師の治療を受けている人。  
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
そ の 他	刺激感

- 10日間位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

■ 効能・効果

きれ痔(さけ痔)・いぼ痔の痛み・かゆみ・はれ・出血の緩和及び消毒

## ■ 用法・用量

適量を取り、肛門部に塗布する。なお、1日3回まで使用できる。

### <用法・用量に関連する注意>

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 肛門部にのみ使用してください。

## ■ 成分・分量 (100g中)

d l-メチルエフェドリン塩酸塩	500mg
アミノ安息香酸エチル	6000mg
グリチルレチン酸	1000mg
イソプロピルメチルフェノール	100mg
シコン抽出油(原生薬換算量1200mg)	4000mg

※添加物として、白色ワセリン、セタノール、ステアリン酸ポリオキシシル40を含有します。

## ■ 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 軟膏が冷たくなりすぎるとチューブから出なくなる場合があります。  
その場合には、暖かい場所に移してしばらくしてから使用してください。
- (5) 本製品は日時の経過とともに色調の変化が幾分見られますが、有効成分の効果には変わりありません。
- (6) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記までお願いいたします。

合名会社 東宝製薬 電話 058-251-6668(代表)  
受付時間 10:00~16:00(土・日・祝日を除く)

製造販売元 **合名会社 東宝製薬**  
岐阜市沖ノ橋町3丁目45番地