

使用前にこの説明文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

鎮痛消炎シップ剤

クールリンファスGS

24 (8枚×3袋)
枚入

10cm×14cm

第3類医薬品

特長

- クールリンファスGSは、貼り薬特有のニオイをおさえた爽香性タイプの冷感シップ剤です。
- 粘着力が強く、皮膚にピタッと良くつきます。
- 4つの有効成分が患部に効果をあらわします。
- 伸縮性タイプの不織布で関節部位の貼付にも便利です。

使用上の注意

❌ してはいけないこと

[守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります]

次の部位には使用しないで下さい。

(1)目の周囲、粘膜等 (2)湿疹、かぶれ、傷口

🗨️ 相談すること

- 1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- 2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

- 3.5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

効能・効果

打撲、捻挫、筋肉痛、筋肉疲労、関節痛、腰痛、肩こり、骨折痛、しもやけ

用法・用量

表面のフィルムをはがして、1日1～2回患部に貼付して下さい。
必要な時は、包帯又はテープでとめて下さい。

用法・用量に関する注意

- 1.定められた用法・用量を守って下さい。
- 2.体の表面に脂や汗がある場合は、よく拭き取ってから貼付して下さい。
- 3.本剤に触れた手で、目、鼻腔、唇などの粘膜に触れないよう注意して下さい。
- 4.小児に使用させる場合には、保護者の指導監督の下に使用させて下さい。

成分・分量 (膏体100g中)

サリチル酸グリコール ……1.5g β -メントール ……0.5g
トコフェロール酢酸エステル…0.3g グリチルレチン酸 ……0.05g

※添加物としてエデト酸Na水和物、カオリン、酸化チタン、CMC-Na、ジヒドロキシアルミニウムアミノアセテート、D-ソルビトール、グリセリン、酒石酸、ポリソルベート80、ポリビニルアルコール、ポリアクリル酸部分中和物、カルボキシビニルポリマー、ヒマシ油、香料を含有します。

保管及び取り扱い上の注意

- 1.直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- 2.使用後は、未使用分を袋に戻し、外気に触れないよう開封口のチャックをきちんと閉めて保管して下さい。
- 3.小児の手の届かない所に保管して下さい。
- 4.他の容器に入れ替えないで下さい。

【誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。】

- 5.使用期限を過ぎたものは使用しないで下さい。
- 6.開封後は、品質保持の点からなるべく早くご使用下さい。

【包装】24枚入 (8枚入×3袋/1枚:10cm×14cm)

製造販売元

株式会社ミクロ薬品

〒475-0828 愛知県半田市瑞穂町2の6の5

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/>
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

本剤についてのお問い合わせは、下記をお願いします。

株式会社ミクロ薬品 TEL 0569-32-9450

受付時間(9:00～12:00、13:00～17:00土・日・祝日を除く)



製造番号

使用期限