

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

〈鎮咳去痰薬〉  
第1類医薬品

せき・たんに……

# アネトン® せき止め顆粒

アネトンせき止め顆粒はいろいろな原因で起こる“せき”をしずめ“たん”の切れをよくします。



## 使用上の注意

### ❌ してはいけないこと

【守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります】

1. 次の人は服用しないでください  
本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください  
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください  
（眠気等があらわれることがあります。）
4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください
5. 過量服用・長期連用しないでください  
（倦怠感や虚脱感等があらわれることがあります。）



### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください  
 (1) 医師の治療を受けている人。  
 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。  
 (3) 発熱している小児。  
 (4) けいれんを起こしたことがある小児。  
 (5) 高齢者。  
 (6) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
 (7) 次の症状のある人。  
 高熱、排尿困難  
 (8) 次の診断を受けた人。  
 心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害、てんかん、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症\*2
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胃腸出血
精神神経系	めまい、意識の低下、けいれん
循 環 器	動悸
呼 吸 器	呼吸が荒い
泌 尿 器	排尿困難
そ の 他	貧血、からだがだるい

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症 状 の 名 称	症 状
ショック（アナフィラキシー）	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
横紋筋融解症	手足・肩・腰等の筋肉が痛む、手足がしびれる、力が入らない、こぼれる、全身がだるい、赤褐色尿等があらわれる。

症状の名称	症状
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。
呼吸抑制*2	息切れ、息苦しさ等があらわれる。*2

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください  
便秘、口のかわき、眠気
- 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

#### 【効能・効果】

せき、たん

#### 【用法・用量】

次の量を、水又はお湯で服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数	さらに就寝前に1回服用することができます。
成人(15歳以上)	1包	3回	
12歳以上*1 15歳未満	2/3包	(食後)	
12歳未満*1		服用しないでください。	

#### 【用法・用量に関連する注意】

- 用法・用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- 本剤を服用している間は、効果が弱まるおそれがありますので、セイヨウオトギリソウ（セント・ジョーンズ・ワート）含有食品を摂取しないでください。

#### 【成分・分量】

アネトンせき止め顆粒は白色の顆粒剤で、成人1日量（4包）中（1包1.5g）の成分、分量及びその主なはたらきは次のとおりです。

成分	分量	はたらき
コデインリン酸塩水和物(リン酸コデイン)	60mg	せきを起こす中枢に作用し、せきをおさえるすぐれた効果があります。
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	40mg	気管支を拡張する作用と気管支のけいれんをおさえる作用により、せきをしずめます。
テオフィリン	160mg	気管支筋弛緩作用により、せきをしずめます。
グアヤコールスルホン酸カリウム	270mg	気道粘液の分泌を亢進させ、たんをうすくし、出しやすくします。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	8mg	抗ヒスタミン剤の一つで、アレルギーが原因となって起こるせきに効果があります。

添加物として、サッカリンNa、白糖、ピロ亜硫酸Na、ポピドン、ステアリン酸Mgを含有します。

#### 【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。
- 他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり品質が変わります。）。
- 使用期限（外箱に記載）をすぎた製品は服用しないでください。



#### 【包装】

アネトンせき止め顆粒：16包

本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。  
 武田コンシューマヘルスケア株式会社 「お客様相談室」 フリーダイヤル 0120-567-087  
 受付時間：9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

製造販売元 **ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社**

〒101-0065 東京都千代田区西神田 3-5-2

販売元 **武田コンシューマヘルスケア株式会社**

〒541-0045 大阪市中央区道修町四丁目1番1号

© J&JKK2017  
 登録商標  
 91003