



飲用不可

殺菌消毒薬 第2類医薬品

ジクロシア[®]2.5g錠

ジクロルイソシアヌール酸ナトリウム製剤

まぜるな危険 酸性の洗浄・漂白剤、シアヌール酸系の製品と混合すると塩素ガスが発生して危険ですのでおやめください。

第2類医薬品

殺菌消毒薬

ジクロシア[®]2.5g錠

ジクロルイソシアヌール酸ナトリウム製剤

30
錠入

発売元



ヨシダ製薬

吉田製薬株式会社
東京都中野区中央5-1-10

製造
販売元



日産化学工業株式会社
東京都千代田区神田錦町3-7-1

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

- 本品は飲まないでください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 手の荒れやすい方は、取扱い時に炊事用手袋などをご使用ください。

【使用上の注意】

相談すること

1. 本品をあやまって飲み込んだ時は、すぐに水、生卵、ミルク等を飲み、この製品を持って医師に相談してください。
2. 目に入らないように注意してください。目に入った場合には、こすらずにすぐに水又はぬるま湯で十分に洗い流してください。なお、症状が重い場合には、この製品を持って眼科医に相談してください。
3. 本品の溶液との接触により、手の荒れ、発疹・発赤、かゆみ等の症状があらわれた場合には使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果、用法・用量】

哺乳びん、乳首の消毒殺菌：水10L当たり本品1錠を溶かした液に1時間以上浸す。

(用法・用量に関連する注意)

- 1.定められた用法・用量を厳守してください。
- 2.液体タイプの塩素系洗浄・漂白剤、酸性の洗浄・漂白剤等との混合は危険ですので避けてください。
- 3.金属製の容器は用いないでください。また、哺乳びんバサミ、スプーン等の金属製品や、指輪等貴金属を本品の溶液につけることも避けてください。メラミン食器等には、本品の使用を避けてください。
- 4.調製後、本品の溶液が変色した場合、その水での調製を避けてください。

【成分及び分量】

本品1錠中ジクロロイソシアヌール酸ナトリウム2.5g。添加物として、アジピン酸、炭酸水素ナトリウムを含む。

【保管及び取扱い上の注意】

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
2. 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)
3. 衣類等につくと脱色、変色することがありますので注意してください。
4. 殺菌消毒する製品によっては印刷面(文字、絵)、材質など変色・変質することがあります。

お問い合わせ先
吉田製薬株式会社 お客様相談室
東京都中野区中央5-1-10
TEL.03-3381-2004
受付時間 9:00~17:00
(土、日、祝日を除く)



製造
番号

使用
期限

