

服用に際して、必ずこの説明文書をお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第②類医薬品

鼻炎用内服薬

くしゃみ・鼻みず・鼻づまり

# ジキナ<sup>®</sup>鼻炎カプセルS



## 使用上の注意

### ❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

- 次の人は服用しないでください。
  - 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
  - 次の症状のある人 前立腺肥大による排尿困難
  - 次の診断を受けた人 高血圧、心臓病、甲状腺機能障害、糖尿病
- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。  
他の鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）
- 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。  
(眠気等があらわれることがあります。)
- 長期連用しないでください。



### 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - 医師の治療を受けている人 (2)妊婦又は妊娠していると思われる人 (3)授乳中の人 (4)高齢者 (5)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (6)かぜ薬、鎮咳去痰薬、鼻炎用内服薬等により、不眠、めまい、脱力感、震え、動悸を起こしたことがある人 (7)次の症状のある人 高熱、排尿困難 (8)次の診断を受けた人 緑内障、腎臓病 (9)モノアミン酸化酵素阻害剤で治療を受けている人※モノアミン酸化酵素阻害作用等を有する医薬品は以下のようなものがあり、いずれもパーキンソン病の治療に用いられます。また、ゾニサミドはてんかんの治療にも用いられます。●セレギリン塩酸塩 ●ゾニサミド ●エンタカポン
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状	関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ	精神神経系	めまい、不眠、神経過敏、けいれん
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振	泌 尿 器	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ（小膿疱）が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。

裏面もお読みください。

症状の名称	症 状
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

口のかわき、眠気

4. 5～6日間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

### 効能・効果

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：  
くしゃみ、鼻みず（鼻汁過多）、鼻づまり、なみだ目、のどの痛み、頭重（頭が重い）

### 用法・用量

次の1回量を1日3回、毎食後に水又はお湯で服用してください。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
成人（15才以上）	1 カプセル	3 回
15才未満	服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

(1)定められた用法・用量を厳守してください。

(2)カプセルの取り出し方

右図のようにカプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押し、裏面のアルミ箔を破り、取り出してお飲みください。  
（誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。）

(PTPシートの取り出し図)



### 成分・分量

1日量(3カプセル)中

成 分	含 量	はたらき
クロルフェニラミンマレイン酸塩	12mg	アレルギー性鼻炎の症状（くしゃみ、鼻みず、鼻づまり）を緩和します。
ブソイドエフェドリン塩酸塩	90mg	血管収縮作用があり、鼻粘膜の充血・炎症をしずめます。
無水カフェイン	120mg	中枢神経を興奮させ、頭の重い感じをスッキリさせます。またクロルフェニラミンマレイン酸塩による眠気を軽減させます。
シンイ乾燥エキス（原生薬換算量）	25mg (300mg)	頭重を伴う鼻炎、鼻づまりなどの症状をやわらげます。

添加剤：結晶セルロース、トウモロコシデンプン、カルメロースCa、ヒドロキシプロピルセルロース、クエン酸水和物、ステアリン酸Mg、（カプセル本体中：ヒプロメロース、カラギーナン、ソルビタン脂肪酸エステル）含有

### 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。）
- (4)配置期限を過ぎた製品は服用しないでください。

お問い合わせ先 株式会社 富士薬品（学術室）  
電話（048）648-1118 9：00～17：30（土、日、祝日を除く）

製造販売元 **株式会社 富士薬品**

埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目383番地