

2018年2月作成

ご使用に際し、この添付文書は必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

花粉・ハウスダスト等による目のアレルギー症状の緩和に

第2類医薬品

マリンアイAL

15mL

眼科用薬

花粉やハウスダストなどによるアレルギー性の目のかゆみや充血は、つらく誰しも憂うつになってしまうものです。

マリンアイALは、このようなアレルギー性の目の症状を改善する目薬として開発されました。抗アレルギー成分であるクロモグリク酸ナトリウムと抗ヒスタミン剤のクロルフェニラミンマレイン酸塩のダブルアクションで、このような不快な症状を緩和します。

本剤に配合されているクロモグリク酸ナトリウムは、アレルギー症状が起こらないように抑え、クロルフェニラミンマレイン酸塩は、起こってしまったアレルギー症状を緩和します。

さわやかな清涼感とやさしい差し心地がアレルギーによる目の不快感を鎮めます。

花粉やハウスダスト等による目のアレルギー症状に使用する目薬です。

症状がアレルギーによるものかどうか分からないときは医師に相談してください。

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと事故が起こりやすくなります)

- 点鼻薬と併用する場合には、使用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください
(眠気等があらわれることがあります)

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)減感作療法等、アレルギーの治療を受けている人。
- (3)妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (5)次の症状のある人。

- (6)次の診断を受けた人。

緑内障

- (7)アレルギーによる症状か他の原因による症状かはっきりしない人。

特に次のような場合は、アレルギーによるものとは断定できないため、使用前に医師に相談してください。

- ・片方の目だけに症状がある場合
- ・目の症状のみで、鼻には症状がみられない場合
- ・視力にも影響がある場合

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、痛み

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック(アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ等があらわれる。

3. 次の場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1)目のかすみが改善されない場合。
- (2)2日間使用しても症状がよくならない場合。

4. 症状の改善がみられても2週間を超えて使用する場合は、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

(必ず裏面もお読みください)

効能・効果

花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のような目のアレルギー症状の緩和:目のかゆみ、目の充血、目のかすみ(目やにの多いときなど)、なみだ目、異物感(コロコロする感じ)

用法・用量

1回1～2滴、1日4～6回点眼してください。2日間使用しても症状の改善がみられない場合には、医師又は薬剤師に相談してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2)容器の先をまぶた、まつ毛などに触れさせないでください。また、混濁したものは使用しないでください。
- (3)コンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (4)点眼用にのみ使用してください。

成分

成 分	含有量(100mL中)	はたらき
クロモグリク酸ナトリウム	1000mg	アレルギーの原因となる化学伝達物質の放出を抑制します。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	15mg	抗ヒスタミン作用により、アレルギー症状の目のかゆみ・充血を緩和します。

添加物:イプシロン-アミノカプロン酸、ホウ酸、パラオキシ安息香酸メチル、パラオキシ安息香酸プロピル、エデト酸ナトリウム水和物、エタノール、d-ボルネオール、d-カンフル

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)他の人と共用しないでください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、開封後は使用期限内であってもなるべく速やかに使用してください。
- (6)保存の状態によっては、成分の結晶が容器の点眼口周囲やキャップの内側につくことがあります。その場合には清潔なガーゼで軽くふきとってから使用してください。

お問い合わせ先

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、又は下記までお願い申し上げます。

佐賀製薬株式会社 お客様相談窓口

電 話： 0942-92-5656

受付時間： 午前9:00～午後5:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元 佐賀製薬株式会社 〒841-0201 佐賀県三養基郡基山町小倉481

L-18BA