

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

鎮痒消炎薬

かゆみ・虫さされに

# リドベートGXゲル

第②類医薬品

- リドベートGXゲルは、アンテドラッグステロイドを配合したお薬で、11の成分が虫さされのしつこいかゆみや湿疹、かぶれなどにしっかりと効きます。
- アンテドラッグステロイドとは  
プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステルは、患部で優れた抗炎症作用を発揮しその後、体内に吸収されると作用の弱い物質に分解される特性があります。
- 患部にお薬をより長く留めるために、高分子(セルロース類)を配合してゲル状にしています。

- ・抗炎症成分：プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル、グリチルリチン酸二カリウム、サリチル酸グリコール
- ・かゆみ止め成分：ジフェンヒドラミン塩酸塩、クロタミトン、リドカイン
- ・肌の修復成分：パンテノール
- ・血行促進成分：トコフェロール酢酸エステル
- ・殺菌成分：イソプロピルメチルフェノール
- ・清涼感成分：l-メントール、dl-カンフル



## 使用上の注意



### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の部位には使用しないでください  
(1) 水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部。  
(2) 創傷面、目の周囲、口唇、粘膜等。
2. 顔面には、広範囲に使用しないでください
3. 長期連用しないでください



### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
(1) 医師の治療を受けている人。  
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。  
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(4) 患部が広範囲の人。  
(5) 湿潤やただれのひどい人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、ヒリヒリ感
皮膚(患部)	みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

## 【効能・効果】

虫さされ、かゆみ、湿疹、皮膚炎、かぶれ、じんましん、あせも

裏面もお読みください。

## 【用法・用量】

1日数回、適量を患部に塗布してください。

## ＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) 定められた用法・用量を守ってください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 外用にのみ使用してください。
- (5) 塗布後、その部位をラップフィルム、絆創膏などの通気性の悪いもので覆わないでください。

## 【成分・分量】(100g中)

成分	分量	はたらき
プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル (アンテドラッグステロイド剤 PVA)	0.15g	湿疹、皮膚炎等の炎症を鎮めます。
ジフェンヒドラミン塩酸塩	2.0g	抗ヒスタミン作用により、かゆみの発生を抑えます。
クロタミトン	5.0g	かゆみを鎮めます。
グリチルリチン酸二カリウム	0.3g	炎症を鎮めます。
l-メントール	3.5g	
dl-カンフル	1.0g	清涼感を与え、かゆみを鎮めます。
リドカイン	2.0g	局所麻酔作用により、かゆみをすばやく鎮めます。
イソプロピルメチルフェノール	0.1g	殺菌作用があります。
パンテノール	1.0g	はれ、赤みをおびた肌の修復を促進させます。
サリチル酸グリコール	1.0g	皮膚の炎症を鎮めます。
トコフェロール酢酸エステル	0.1g	血行を良くして皮膚の新陳代謝を高め修復を助けます。

添加物：1,3-ブチレングリコール、ヒプロメロース、ヒドロキシエチルセルロース、疎水化ヒドロキシプロピルメチルセルロース、BHT、エタノール、pH調節剤を含有します。

## ＜成分に関連する注意＞

本剤はアルコールを含んでいるので、塗布時にしみる場合があります。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えしないでください(誤用の原因になったり、品質が変わるのを防ぐため。)
- (4) 火気に近づけないでください。また、使用後は火中に投じないでください。
- (5) 揮発性がありますので、使用後はキャップをしっかり締めてください。
- (6) 本剤のついた手で、目や粘膜に触れないでください。
- (7) メガネ、時計、アクセサリなどの金属類、衣類、プラスチック類、皮革製品、床や家具などの塗装面などに付着すると変質又は変色する場合がありますので、付着しないように注意してください。
- (8) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、開封後は使用期限内であっても、なるべく速やかに使用してください。

本剤について、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。


消費者相談窓口：協和薬品工業株式会社 お客様相談室

☎ 058-246-8771


受付時間 9:00~12:00・13:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元 **協和薬品工業株式会社**  
岐阜県岐阜市野一色二丁目8番6号

●チューブの折り(尾)の部分から先端に向けて順に押し出して下さい。  
(①→②)



●チューブが破れて薬剤がとび出るおそれがあります。  
折り曲げないで下さい。 折りたたまないで下さい。



## 火気厳禁

第二石油類 危険等級Ⅲ  
(クロタミトン、エタノール)