


MO07



製造番号

使用期限



1

皮膚疾患治療薬 8つの成分がすばやく効く クリーム 12g

配合 PVA 抗炎症成分

# テクトソフエクトプラス

ベタつかないさらとしたクリームタイプ

第②類医薬品

かまんできない症状を抑えます。

3つの作用で

- 殺菌作用
- かゆみ止め作用
- 消炎作用



A-3002

かまんできない 湿疹、かゆみ 皮膚炎に

あせも 虫さされ

じんましん

体内では低活性

皮膚患部でよく効き

理療特許

特許製剤

KEF-4424212

ご使用に際して、このケースの記載内容を必ず読んでください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

販売名 テクトソフエクトプラスクリーム 第②類医薬品 (皮膚疾患治療薬)

### △ 使用上の注意

- × してはいけないこと**
- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
- 次の部位には使用しないでください
    - (1) 水痘(水ぼうそう)、みずむし(みずし)等又は化膿している患部。
    - (2) 目の周囲、粘膜等。
  - 顔面には、広範囲に使用しないでください
  - 長期連用しないでください

- 相談すること**
- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
    - (1) 医師の治療を受けている人。
    - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
    - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
    - (4) 患部が広範囲の人。
    - (5) 湿潤やただれのひどい人。
  - 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、このケースを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、ヒリヒリ感
皮膚(患部)	みずむし(たむし)等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

3.5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、このケースを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- 効能・効果**
- 湿疹、皮膚炎、あせも、かぶれ、かゆみ、虫さされ、じんましん
- 用法・用量** 1日数回、適量を患部に塗擦してください。
- 用法・用量に関連する注意**

- (1) 定められた用法・用量を守ってください。(2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診察を受けてください。(4) 外用にのみ使用してください。

- 成分・分量**
- (1g中) プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル(PVA) 1.5mg、グリチルリチン酸 5mg、ジフェニドラミン塩酸塩 20mg、クロタメトン 50mg、リドカイン 20mg、トコフェロール酢酸エステル 10mg、アラントイン 2mg、イソプロピルメチルフェーノール 1mg、添加物として、セトステアリルアルコール、中鎖脂肪酸トリグリセリド、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、モノステアリン酸グリセリン、プロピレングリコール、ヒドロキシエチルセルロース、エトナールNa、パラベン、リン酸、水酸化ナトリウム、ジブチルヒドロキシトールを含有します。
- 保管及び取扱上の注意**

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり、品質が変わります。)
- (4) 使用期限(ケースに記載)を過ぎた製品は使用しないでください。

副作用検査実施回数 ☎0120-149-931

製造販売元 協和薬品工業株式会社  
 岐阜県岐阜市野一色二丁目8番6号

☎ 058-246-8771  
 受付時間 9:00～12:00・13:00～17:00  
 (注:日、祝日を除く)

テクトソフエクトプラス

第②類医薬品

テクトソフエクトプラス

第②類医薬品

