



12g



第②類医薬品

効果・効能を記載する欄です。

3つの作用

潤滑作用

鎮静作用

消炎作用



皮膚疾患治療
テシントフェクトプラス軟膏

皮膚炎
湿疹、かゆみ
虫刺され

効果発現

ご使用に際して、このケースの記載内容を必ず読んでください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

販売名 テシントフェクトプラス軟膏 第②類医薬品
(皮膚疾患治療薬)

△ 使用上の注意

× してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
 1.次の部位には使用しないでください
 (1)水痘(水ぼうそう)、みずむししたむし等又は化膿している部位。
 (2)目の周囲、粘膜等。
 2.顔面には、広範囲に使用しないでください
 3.長期連用しないでください

■ 相談すること

- 1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 (1)医師の治療を受けている人。
 (2)妊娠又は妊娠していると思われる人。
 (3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 (4)患部が広範囲の人。
 (5)湿潤やただれのひどい人。
 2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、このケースを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発癢、発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、ヒリヒリ感
皮膚(患部)	みずむししたむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

3.5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、このケースを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

湿疹、皮膚炎、あせも、かぶれ、かゆみ、虫され、じんましん



用法・用量 1日数回、適量を患部に塗擦してください。

用法・用量に関する注意

- (1)定められた用法・用量を守ってください。(2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(3)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。(4)外用のみの使用してください。

成分・分量

(1g中)ブレニゾロン吉草酸エチル酢酸エチル(PVA) 1.5 mg、グリチルチン酸 5mg、ジフェンヒドロミン塩酸塩 20mg、クロタミン 50mg、リドカイン 20mg、トコフェロール酢酸エチル 10mg、アラントイン 2mg、イソプロピルメチルフェノール 1mg、添加物として、マクロゴール、クエン酸水和物を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり、品質が変わります。)。(4)使用期限(ケースに記載)を過ぎた製品は使用しないでください。

副作用被害救済制度 0120-149-931

本剂について、何かお気付いの点がございましたら、お買い求めのお店又は販売店までご連絡いただけますようお願い申し上げます。
消費者相談窓口:協和薬品工業株式会社
お客様相談室

☎ 058-246-8771
要付時間 9:00~12:00 13:00~17:00
(平日、祝日を除く)