

押して開ける

保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。2. 小児の手の届かない所に保管してください。3. 誤用を避け、品質を保持するため、他の容器に入れ替えないでください。4. ビンの中の詰め物は、輸送中の錠剤の破損を防止するためのものですので、開封後に捨ててください。5. ビンの中の包装紙に包まれた平型錠は乾燥剤です。服用しないでください。6. 服用のつどビンのキャップをしっかり閉めてください。(吸湿し品質が変わることがあります。) 7. 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。8. 使用期限内であっても、品質保持の点から開封日より6ヵ月以内に服用してください。

この製品についてのお問い合わせは、下記にお願い申し上げます。

株式会社えがお 電話：0120-241-241
HP：<http://www.241241.jp>

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai/camp/index.html>
電話：0120-149-931 (フリーダイヤル)

製造販売元 シオノケミカル株式会社

東京都中央区八重洲2丁目10番10号



販売元

株式会社えがお
えがお 熊本県熊本市東区東町4-10-1



A1

成分・分量

1日量 (6錠) 中

成分	分量
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	200mg
チアミン硝化物(ビタミンB ₁)	30mg
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB ₆)	30mg
ニコチン酸アミド	30mg
ガンマーオリザノール	10mg

添加物:グルコサミン塩酸塩、ヒドロキシプロピルセルロース、結晶セルロース、クロスボビドン、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、マクロゴール6000、酸化チタン、タルク、黄色三二酸化鉄

効能・効果

- 次の諸症状の緩和：神経痛、筋肉痛・関節痛(腰痛、肩こり、五十肩など)、手足のしびれ、便秘、眼精疲労
- 脚気
「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談すること。」
- 次の場合のビタミンB₁の補給：肉体的疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

用法・用量

次の量を食後に水又はぬるま湯で服用してください。

年齢	1回量	服用回数
成人(15歳以上)	2錠	1日3回
15歳未満	服用しないこと	

用法・用量に関する注意

用法・用量を守ってください。

EGAO 180錠(30日分)

ひざ・肩・腰などの 関節痛 腰痛 神経痛

コンドロイチン

ビタミンB₁・B₆配合



飲んで効果がでる医薬品

第3類
医薬品

アユムンEX

第3類医薬品

ビタミンB₁主薬製剤

アユムンEX

服用に際して、この説明文を必ずお読みください。又、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

⚠ 使用上の注意



■ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
・薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、口内炎、食欲不振、胃部不快感

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
・軟便、下痢
4. 1ヵ月位服用しても症状がよくなりな場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。