

発熱性消耗性疾患時の栄養補給

服用に際して、瓶の表示を必ず読むこと
使用上の注意

【相談すること】

次の場合は、直ちに服用を中止し、この瓶を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合。皮膚：発疹、消化器：胃部不快感
- (2) しばらく服用しても症状がよくなる場合。

成分・分量

【成分】1瓶(30mL)中

リポフラビンリン塩エステルナトリウム	3mg
ピリドキシン塩酸塩	10mg
ニコチン酸アミド	30mg
カルニチン塩化物	100mg
タウリン	1000mg
無水カフェイン	50mg
イノシトール	50mg
ニンジンエキス	90mg
ゴオウチンキ	100μL
ロクジョウチンキ	10μL
[アルコール0.7mL以下]	

添加物：白糖、果糖ブドウ糖液糖、ロソルビトール液、DL-リンゴ酸、L-グルタミン酸ナトリウム、安息香酸ナトリウム、パラオキシ安息香酸ナトリウム、エタノール、カラメル、香料、グリセリン、バニリン、エチルバニリン、プロピレングリコール
・本品は、生薬成分を含むため、まれに沈殿を生じることがありますが、服用に支障はありません。

製造年月日(ロットNo.)

滋養強壯 虚弱体質

第3類医薬品

人参 牛黄

ロクジョウ 30mL

クロンミン 内服液II

¥450+税

発売元

第一薬品浦田営業所
富山市水橋町720番地

効能又は効果

【効能】滋養強壯、虚弱体質、肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

用法・用量

【用法・用量】成人(15歳以上) 1日1回1瓶(30mL)を服用する。
(1) 用法・用量を守ること。(他のビタミン等を含有する製品を同時に使用する場合には過剰摂取等に注意すること)(2) よく振ってから服用すること。

保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること(2) 小児の手のとどかない所に保管すること(3) 誤用を避け、品質を保持するために、他の容器に入れかえないこと(4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと

販売名：クロンミン内服液II

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

製造販売元 A18IS。

大同薬品工業株式会社

奈良県葛城市新村214番地1

使用期限