

発熱性消耗性疾患時の栄養補給

効能又は効果

服用に際して、瓶の表示を必ず読むこと  
使用上の注意

滋養強壯  
虚弱体質

第3類医薬品

【効能】 滋養強壯・虚弱体質・肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

用法・用量

【用法・用量】 成人（15歳以上）1日1回1瓶（30mL）を服用する。  
（1）用法・用量を守る。他のビタミン等含有する製品を同時に使用する場合には過剰摂取等に注意すること（2）よく振ってから服用すること。

保管及び取扱い上の注意

（1）直射日光の当たらない涼しい所に保管すること（2）小児の手のとどかない所に保管すること（3）誤用を避け、品質を保持するために、他の容器に入れかえないこと（4）使用期限を過ぎた製品は服用しないこと

販売名：クロンミン内服液II

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

製造販売元 A18ISo

大同薬品工業株式会社

奈良県葛城市新村214番地1

使用期限

【相談すること】  
次の場合は、直ちに服用を中止し、この瓶を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

（1）服用後、次の症状があらわれた場合。皮膚：発疹、消化器：胃部不快感  
（2）しばらく服用しても症状がよくなる場合。

成分・分量

【成分】1瓶（30mL）中  
リボフラビンリン酸エステルナトリウム…… 3mg  
ピリドキシン塩酸塩 …………… 10mg  
ニコチン酸アミド …………… 30mg  
カルニチン塩化物 …………… 100mg  
タウリン …………… 1000mg  
酢水カフェイン …………… 50mg  
イノシトール …………… 50mg  
ニンジンエキス …………… 90mg  
ゴウウチンキ …………… 100μL  
ロクジョウチンキ …………… 10μL

【アルコール0.7mL以下】  
添加物：白糖、果糖ブドウ糖液糖、D-ソルビトール液、DL-リンゴ酸、L-グルタミン酸ナトリウム、安息香酸ナトリウム、パラオキシ安息香酸ブチル、エタノール、カラメル、香料、グリセリン、パコリン、エチルピコリン、プロピレングリコール  
・本品は、生薬成分を含むため、まれに沈澱を生じることがありますが、服用に支障はありません。

製造年月日（ロットNo.）



ロクジョウ 30mL

クロンミン

内服液II

¥450+税

発売元

日新製薬株式会社  
奈良県橿原市兵部町2番9号