

湿疹・皮膚炎治療薬 プレゾαクリーム

アンテドラッグ

プレゾαクリームは、医療用から一般用に転用された「プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル」を配合したステロイド外用剤で、患部ですぐれた効果を発揮し、体内に吸収されると作用の弱い物質に分解されるという特徴をもった、アンテドラッグと呼ばれるおぐすりです。



使用上の注意

してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の部位には使用しないこと

水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部。

2. 顔面には、広範囲に使用しないこと

3. 長期連用しないこと

相談すること



1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4) 患部が広範囲の人。
- (5) 湿潤やただれのひどい人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
皮 膚(患部)	みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】

湿疹、皮ふ炎、あせも、かぶれ、かゆみ、虫さされ、じんましん

【用法・用量】

1日数回、適量を患部に塗擦する。

【用法・用量に関連する注意】

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 目に入らないように注意してください。
万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。
なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3) 外用にのみ使用してください。
- (4) 定められた用法、用量を厳守してください。

【成分・分量】1g中

プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル …………… 1.5mg
添加物として流動パラフィン、プロピレングリコール、ワセリン、ステアリン酸プロピレングリコール、グリセリン脂肪酸エステル、ミリスチン酸イソプロピル、ポリソルベート60、ステアリン酸ポリエチレングリコール、パラフィン、ステアリン酸、ソルビタン脂肪酸エステル、ポリソルベート20、パラベンを含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わるのを防ぐため。)
- (4) 使用期限(ケースに記載)を過ぎた製品は使用しないでください。

このお薬についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記へお願いいたします。

奥田製薬株式会社 お客様相談窓口

☎ (06) 6351-2100 (代表) (午前9時から午後5時まで、土日祝日を除く)

発売元



奥田製薬株式会社

大阪市北区天満1丁目4番5号
<http://www.okudaseiyaku.co.jp>

製造販売元

日本ゼトック株式会社

東京都新宿区西新宿 1-26-2



：キャップ

金属：チューブ