

参茸旺壽S (サンジョウオウジュS)

(使用上の注意) 相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 皮膚：発疹／消化器：胃部不快感、下痢
2. しばらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

(成分・分量) 1日量1本(30mL)中
チアミン硝化物10mg、インヨウカク流エキス150 μ L
(インヨウカク150mgに相当)、ゴオウ抽出液200 μ L
(ゴオウ4mgに相当)、ニンジンエキス54.1mg(ニンジン600mgに相当)、ロクジョウチンキ350 μ L(ロクジョウ100mgに相当) 添加物：白糖、D-ソルビトール、クエン酸水和物、クエン酸ナトリウム水和物、DL-リンゴ酸、安息香酸Na、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、エドト酸Ca/2Na、pH調節剤、エタノール、香料、プロピレングリコール、バニリン、エチルバニリングリセリン、メントール [(アルコール)1.3mL以下]

(効能・効果)

滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病中病後・胃腸障害・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給

(用法・用量)

成人(15歳以上)1日1回1本(30mL)を服用する。
・15歳未満は服用しないこと。・用法及び用量を厳守すること。・本剤は、まれに沈殿を生じることがある。よく振って服用すること。

ML02



かぜなどの
発熱性消耗性疾患時
病中病後の栄養補給に

参茸旺壽S

サンジョウオウジュS

第2類医薬品

30mL

(保管及び取扱い上の注意)

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)。
- (4)使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。
- (5)加温、冷凍はさけること。

副作用被害救済制度

0120-149-931

ガラス：瓶 金属：キャップ

販売元

薬ヒグチ&ファーマライズ株式会社
東京都中野区中央一丁目38番1号

製造販売元 田村薬品工業株式会社
奈良県御所市西寺田50

お客様相談室 06-6203-5151
受付時間：10:00～17:00(土、日、祝日を除く)

使用期限

製造番号



4