

この添付文書は、本剤のご使用前に必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

鎮痒消炎薬 湿疹・かゆみ・虫さされに

エクシロンプロ クリーム

第2類医薬品

エクシロンプロクリームは、アンテドラッグステロイド(PVA)を含む8つの有効成分を配合し、かゆみ・湿疹・虫さされなどの症状にすぐれた効果を発揮します。べたつかないクリームタイプです。

「アンテドラッグ」とは皮膚表面の患部で効果を発揮したのち、体内に吸収されると作用の弱い物質に変化する性質を持つ成分です。

- アンテドラッグステロイド成分「プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル(PVA)」が、湿疹・皮膚炎等の炎症を鎮めます。
- 3つのかゆみ止め成分「ジフェニヒドラミン塩酸塩、クロタミトン、リドカイン」が、湿疹・虫さされ等に伴うかゆみを抑えます。
- 抗炎症成分である「グリチルレチン酸」が、炎症を鎮め、かゆみのもとを抑えます。
- 血行促進成分である「トコフェロール酢酸エステル」が、皮膚の血行を促進し、治療効果を高めます。
- 組織修復成分である「アラントイン」が、痛んだ皮膚の組織を修復します。
- 殺菌成分である「イソプロピルメチルフェノール」が、患部の感染を防ぎ、二次感染による悪化を防ぎます。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の部位には使用しないでください。
 - (1) 水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部
 - (2) 目の周囲、粘膜等
2. 顔面には、広範囲に使用しないでください。
3. 長期連用しないでください。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (4) 患部が広範囲の人
 - (5) 湿潤やただれのひどい人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、ヒリヒリ感
皮膚(患部)	みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】

かゆみ、湿疹、虫さされ、皮膚炎、かぶれ、あせも、じんましん


【用法・用量】

1日数回、適量を患部に塗擦してください。


〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を守ってください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 目に入らないようにご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 外用にのみ使用してください。

●チューブの折り(尾)の部分から先端に向けて順に押し出してください。
(①→②)



●チューブが破れて薬剤がとび出るおそれがあります。
折り曲げないでください。 折りたたまないでください。



【成分・分量】

成分	分量 (1g中)	作用
プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル	1.5mg	アンデラッグステロイド成分の1つで、湿疹・皮膚炎等の炎症を鎮めます。
グリチルレチン酸	5mg	抗炎症作用により、炎症を鎮めます。
ジフェンヒドラミン塩酸塩	20mg	抗ヒスタミン作用により、かゆみを抑えます。
クロタミトン	50mg	温感神経に作用して、かゆみを抑えます。
リドカイン	20mg	局所麻酔作用により、かゆみを抑えます。
トコフェール酢酸エステル	10mg	皮膚の血行を促進し、治療効果を高めます。
アラントイン	2mg	痛んだ皮膚の組織を修復します。
イソプロピルメチルフェノール	1mg	殺菌作用により、患部の感染を防ぎ、二次感染による悪化を防ぎます。

添加物として、セトステアリルアルコール、中鎖脂肪酸トリグリセリド、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、モノステアリン酸グリセリン、プロピレングリコール、ヒドロキシエチルセルロース、エドト酸Na、パラベン、リン酸、水酸化ナトリウム、ジブチルヒドロキシルエンを含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 本剤のついた手で、目など粘膜に触れないでください。
- (2) 高温をさげ、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (3) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (4) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後は品質保持の点からなるべく早くご使用ください。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願いします。

万協製薬株式会社「お客様相談室」 電話 0598-30-5376

受付時間10:00～17:00(ただし、土、日、祝日は除きます。)

製造販売元 **万協製薬株式会社**
三重県多気郡多気町五桂1169-142