

△ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

次の部位には使用しないでください。

(1)目の周囲、粘膜等 (2)湿疹、かぶれ、傷口



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、痛み

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ、骨折痛

1日1～2回ライナーをはがし、患部に貼ってください。

<用法・用量に関連する注意>

(1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(2)貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。(3)貼る前に、皮膚の水分や汗をよくふき取ってください。(4)貼りかえるときには、なるべく前に貼ったところから少しずつらして貼ってください。

成分・分量 1.0m²中

dθ-カンフル ……1.80g θ-メントール ……4.50g
 サリチル酸メチル…9.00g トコフェロール酢酸エステル…0.50g
 ハッカ油 ……1.20g ノニル酸ワニリルアミド…0.01g

添加物として、ポリブテン、生ゴム、ポリイソブチレン、エステルガム、テルペン樹脂、炭酸Ca、酸化チタン、アクリル酸メチル・アクリル酸-2-エチルヘキシル共重合樹脂、ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル、天然ゴムラテックス、香料、赤色405号、黄色205号を含有する。

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わります。)(4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

908010202078



夫500



製造販売者 協回薬品工業株式会社
 山形県東置賜郡川西町大字西大塚930

フミアナ家庭薬相談窓口
 ☎ 0238(46)2013
 月～金曜日 9:00～17:00(祝日を除く)