

壮年性脱毛症における発毛剤

リザレック^{コウ} for Lady

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こる可能性があります。)

① 次の人は使用しないでください。

- (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 未成年者(20歳未満)。
(国内での使用経験がありません。)
- (3) 妊婦又は妊娠していると思われる人、並びに授乳中の人。
(妊娠中の使用については、安全性が十分確認されていません。又、ミノキシジルは母乳中に移行します。)
- (4) 妊娠、出産に伴い脱毛している人。
(壮年性脱毛症以外の脱毛症である可能性が高いです。)
- (5) 避妊用ピルの使用をやめたことにより脱毛している人。
(壮年性脱毛症以外の脱毛症である可能性が高いです。)
- (6) 壮年性脱毛症以外の脱毛症(例えば、甲状腺疾患、急激なダイエット、円形脱毛症等)の人、あるいは原因のわからない脱毛症の人。
(本剤は壮年性脱毛症でのみ有効です。)
- (7) 頭頂部だけでなく、側頭部や後頭部も含めた頭部全体が脱毛している人。
(男性に比べ女性に多く見られる甲状腺疾患による脱毛等、壮年性脱毛症以外の脱毛症であったり、脱毛が他の原因によるものである可能性があります。)
- (8) 脱毛が急激であったり、髪が斑状に抜けている人。
(壮年性脱毛症以外の脱毛症である可能性が高いです。)
- (9) 頭皮から強く引っ張るような髪型によって脱毛している人。
(壮年性脱毛症以外の脱毛症である可能性が高いです。)
- (10) 男性。
(本剤は女性用の製品であるため、男性は使用しないでください。)

② 次の部位には使用しないでください。

- (1) 本剤は頭皮にのみ使用し、内服しないでください。
(血圧が下がる等のおそれがあります。)
- (2) きず、湿疹あるいは炎症(発赤)等がある頭皮。
(きず等を悪化させることがあります。)

③ 本剤を使用する場合は、他の育毛剤及び外用剤(軟膏、液剤等)の頭皮への使用は、避けてください。又、これらを使用する場合は本剤の使用を中止してください。
(これらの薬剤は本剤の吸収に影響を及ぼす可能性があります。)

🗨 相談すること

① 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。

- (1) 今までに薬や化粧品等によりアレルギー症状(例えば、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。
- (2) 高血圧の人、低血圧の人。
(本剤は血圧に影響を及ぼす可能性が考えられます。)
- (3) 心臓又は腎臓に障害のある人。
(本剤は心臓や腎臓に影響を及ぼす可能性が考えられます。)
- (4) むくみのある人。
(むくみを増強させる可能性が考えられます。)
- (5) 家族、兄弟姉妹に壮年性脱毛症の人がいない人。
(壮年性脱毛症の発症には遺伝的要因が大きいと考えられます。)
- (6) 高齢者(65歳以上)。
(一般に高齢者では好ましくない症状が発現しやすくなります。)
- (7) 次の診断を受けている人。
甲状腺機能障害(甲状腺機能低下症、甲状腺機能亢進症)。
(甲状腺疾患による脱毛の可能性あります。)

② 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	頭皮の発疹・発赤*、かゆみ、かぶれ、ふけ、使用部位の熱感等
精神神経系	頭痛、気が遠くなる、めまい
循環器	胸の痛み、心拍が速くなる
代謝系	原因のわからない急激な体重増加、手足のむくみ

*頭皮以外にあらわれることもあります。

③ 6ヶ月間使用して、次のいずれにおいても改善が認められない場合は、使用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

脱毛状態の程度、生毛・軟毛の発生、硬毛の発生、抜け毛の程度(太い毛だけでなく細く短い抜け毛の減少も改善の目安となります。)
(男性に比べ女性に多く見られる甲状腺疾患による脱毛等、壮年性脱毛症以外の脱毛症であったり、脱毛が他の原因によるものである可能性があります。)

④ 使用開始後6ヶ月以内であっても、脱毛状態の悪化や、次のような脱毛が見られた場合は、使用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。
頭頂部だけでなく側頭部や後頭部等の頭部全体の脱毛、頭髪以外の脱毛、斑状の脱毛、急激な脱毛等。
(男性に比べ女性に多く見られる甲状腺疾患による脱毛等、壮年性脱毛症以外の脱毛症であったり、脱毛が他の原因によるものである可能性があります。)

その他の注意

- (1) 毛髪が成長するには時間がかかります。効果がわかるようになるまで少なくとも6ヶ月間、毎日使用してください。
(本剤の有効性は6ヶ月間使用した場合に認められています。)
- (2) 毛髪が成長する程度には個人差があり、本剤は誰にでも効果があるわけではありません。
- (3) 効果を維持するには継続して使用することが必要で、使用を中止すると徐々に元に戻ります。
(本剤は壮年性脱毛症の原因を取り除くものではありません。)

効能・効果

壮年性脱毛症における発毛、育毛及び脱毛(抜け毛)の進行予防。

<この医薬品の対象となる壮年性脱毛症>



図よりも脱毛している場合には、効果が得られない可能性があります。

用法・用量

成人女性(20歳以上)が、1日2回、1回1mLを脱毛している頭皮に塗布してください。

<注意>

- ① 用法・用量の範囲より多量に使用しても、あるいは頻繁に使用しても効果はあがりません。定められた用法・用量を厳守してください。(決められた以上に多く使用しても、効果の増加はほとんどなく、副作用の発現する可能性が高くなります。)
- ② 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には眼科医の診療を受けてください。
- ③ 薬液のついた手で、目等の粘膜にふれると刺激があるので、手についた薬液はよく洗い落としてください。
- ④ 髪の長い人は、髪を押し広げ、髪に薬液がつかぬよう、頭皮に丁寧に塗布してください。
- ⑤ アルコール等に溶けるおそれのあるもの(メガネく、化学繊維等)にはつかないようにしてください。
- ⑥ 整髪料及びヘアセットスプレーは、本剤を使用した後に使用してください。
- ⑦ 染毛剤(ヘアカラー、毛染め、白髪染め等)を使用する場合には、完全に染毛を終えた後に本剤を使用してください。
- ⑧ つけ毛やヘアピースを着用の方は本剤を十分に乾燥させた後に装着してください。

成分・分量(100mL中)

成分・分量	はたらき
ミノキシジル	1.0g 発毛、育毛及び脱毛の進行を予防します。
パントテニールエチルエーテル	1.0g 毛細胞に栄養を補給し、頭皮を健全な状態にします。
トコフェロール酢酸エステル	0.08g 皮脂の酸化を防ぎ、頭皮を保護します。
l-メントール	0.3g 頭皮のかゆみをおさえ、清涼感をあたえます。

添加物:エタノール、1,3-ブチレングリコール、プロピレングリコール、ヒアルロン酸ナトリウム(2)、pH調整剤

【無香料】わずかにエタノールなどのニオイがすることがあります。

保管及び取扱い上の注意


- ① 使用後、キャップをして、直射日光や高温、寒冷の場所を避け、涼しい所に保管してください。
- ② 小児の手の届かない所に保管してください。
- ③ 誤用を避け、品質を保持するため、他の容器に入れ替えないでください。
- ④ 火気に近づけないでください。
- ⑤ 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

本製品に関するお問い合わせ

お買い求めのお店又は下記へお願いします。

興和株式会社 医薬事業部 お客様相談センター

TEL 03-3279-7755 FAX 03-3279-7566
受付時間:月~金(祝日を除く)9:00~17:00●興和製品サイト <https://hc.kowa.co.jp/otc>

発売元
 興和株式会社
 〒103-8433 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14

製造販売元
 リョートファイン株式会社
 〒277-0861 千葉県柏市高田1410番地