

宇津こどもせきどめシロップ[®]A

宇津こどもせきどめシロップ[®]Aはお子さまのせき・たんにも効果のあるすぐれた成分を配合した、のみやすいイチゴ味のせきどめです。生薬のナンテンジツとキキョウのエキスも配合しました。小さなお子さまのせきは、長く続くと睡眠や食事などの妨げになり、体力の消耗にもつながりますので、早めのお手当てが大切です。

《特 長》

- ノンシュガー お砂糖を使わずに、おいしい「イチゴ味」のシロップにしました。
- ノンコデイン コデインを含んでいません。
- ノンカフェイン カフェインを含んでいません。
- 容器 小さいお子さまが開けにくい安全キャップを使用したプラスチックボトルです。

⚠ 使用上の注意

本剤は小児用ですが、鎮咳去痰薬に定められた注意事項として成人が服用される際のことも記載しております。



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください

他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬)、鎮静薬

2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください(眠気があらわれることがあります。)



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 授乳中の人。
- (4) 高齢者。
- (5) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (6) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (7) 次の症状のある人。

高熱、排尿困難

(8) 次の診断を受けた人。

心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

| 関係部位 | 症状 |
|-------|------------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消化器 | 悪心・嘔吐、食欲不振 |
| 精神神経系 | めまい |
| その他 | 排尿困難 |

(2) 5～6回服用しても症状がよくなる場合

3. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください

口のかわき

【成分・分量】

本品60mL中

| 成分 | 分量 | 作用 |
|-----------------------|------------------|-----------------------------|
| 臭化水素酸デキストロメトルファン | 30mg | せきの中枢に働いてせきをしずめます。 |
| dl-塩酸メチルエフェドリン | 37.5mg | 気管支に働いてせきをしずめ、たんの排泄を助けます。 |
| グアイフェネシン | 100mg | 気道粘膜に働いて、たんを出しやすくします。 |
| d-マレイン酸クロルフェニラミン | 3mg | 抗ヒスタミン作用により炎症をおさえ、せきをしずめます。 |
| ナンテンジツエキス (原生薬換算量) | 109mg (600mg) | せきをしずめる生薬成分です。 |
| キキョウエキス (原生薬換算量) | 40mg (400mg) | せきをしずめ、たんを出しやすくする生薬成分です。 |

添加物として、還元麦芽糖水アメ、D-ソルビトール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、グリセリン、パラベン、クエン酸Na、クエン酸、アセスルファミK、香料、バニリン、エチルバニリン、プロピレングリコール、エタノールを含有します。

【効能・効果】

せき、たん

【用法・用量】

| 年齢 | 1回服用量 | 1日服用回数 |
|-----------|-------|--|
| 8才以上11才未満 | 10mL | 1日3回食後、および、必要な場合には就寝前に服用してください。場合により1日6回まで服用しても差し支えありませんが、その場合には約4時間の間隔をおいて服用してください。 |
| 5才以上8才未満 | 6.5mL | |
| 3才以上5才未満 | 5mL | |
| 1才以上3才未満 | 4mL | |
| 3ヵ月以上1才未満 | 2mL | |
| 3ヵ月未満 | | 服用しないでください。 |

【用法・用量に関連する注意】

- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- 1才未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合のみ服用させてください。
- 用法・用量を厳守してください。

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- 計量カップは使用のつど、よく水洗いして、本剤とともに清潔に保管してください。また、使用のつどボトルの口の周囲をよく拭いてからキャップをしっかりと締めてください。
- 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- キャップが開けにくいときは、キャップの部分に50～60℃のお湯に2～3分つけると開けやすくなります。

【安全キャップの使用方法】

【あけ方】



【しめ方】



【包装】

120mL

本剤について、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。
宇津救命丸株式会社 お客様相談室

フリーダイヤル 0120-541-419 受付時間/平日9:00～17:00

発売元 宇津救命丸株式会社 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3丁目3番地
製造販売元 新生薬品工業株式会社 〒635-0103 奈良県高市郡高取町清水谷1269