

# 宇津こども鼻炎シロップA

宇津こども鼻炎シロップAはお子さまの鼻かぜなどの急性鼻炎、ハウスダスト・花粉などによるアレルギー性鼻炎などの諸症状の緩和に効果のあるすぐれた成分を配合した、のみやすいブドウ味の鼻炎シロップです。

## 《特 長》

- ノンシュガー お砂糖を使わずに、おいしい「ブドウ味」のシロップにしました。
- ノンカフェイン カフェインを含んでいません。
- 容器 小さいお子さまが開けにくい安全キャップを使用したプラスチックボトルです。

## ⚠ 使用上の注意

本剤は小児用ですが、鼻炎用内服薬に定められた注意事項として成人が服用される際のことも記載しております。



### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください  
他の鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬)
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください(眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります。)
3. 長期連用しないでください



### 相談すること

#### 1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 授乳中の人。
- (4) 高齢者。
- (5) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (6) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (7) 次の症状のある人。

高熱、排尿困難

- (8) 次の診断を受けた人。

緑内障、糖尿病、甲状腺機能障害、心臓病、高血圧

#### 2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	頭痛
その他	排尿困難、顔のほてり、異常なまぶしさ

- (2) 5～6日間服用しても症状がよくなる場合

#### 3. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください

口のかわき、便秘

【成分・分量】

本品60mL中

成分	分量	作用
d-マレイン酸クロルフェニラミン	3mg	くしゃみ、鼻水、鼻づまりなどのアレルギー症状をやわらげます。
dl-塩酸メチルエフェドリン	50mg	鼻粘膜の充血、はれをおさえて、鼻づまりをやわらげます。
ペラドンナ総アルカロイド	0.15mg	鼻水、なみだ目をやわらげます。
グリチルリチン酸二カリウム	33mg	のどや鼻の炎症をやわらげます。

添加物として、還元麦芽糖水アメ、プロピレングリコール、パラベン、クエン酸Na、クエン酸、アセスルファムK、香料、エタノールを含有します。

【効能・効果】

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：  
くしゃみ、鼻水、鼻づまり、なみだ目、のどの痛み、頭痛

【用法・用量】

年齢	1回服用量	1日服用回数
7才以上11才未満	10mL	1日3回食後、および、必要な場合には就寝前に服用してください。場合により1日6回まで服用しても差し支えありませんが、その場合には約4時間の間隔をおいて服用してください。
3才以上7才未満	6.5mL	
1才以上3才未満	5mL	
6ヵ月以上1才未満	4mL	
3ヵ月以上6ヵ月未満	3.3mL	
3ヵ月未満		服用しないでください。


【用法・用量に関連する注意】

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2) 1才未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合のみ服用させてください。
- (3) 用法・用量を厳守してください。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- (4) 計量カップは使用のつど、よく水洗いして、本剤とともに清潔に保管してください。また、使用のつどボトルの口の周囲をよく拭いてからキャップをしっかりと締めてください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (6) キャップが開けにくいときは、キャップの部分に50～60℃のお湯に2～3分つけると開けやすくなります。

【安全キャップの使用方法】



【包装】

120mL

本剤について、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

宇津救命丸株式会社 お客様相談室

フリーダイヤル 0120-541-419 受付時間/平日9:00～17:00

発売元 宇津救命丸株式会社 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3丁目3番地  
製造販売元 新生薬品工業株式会社 〒635-0103 奈良県高市郡高取町清水谷1269