

第2類医薬品

目の疲れ・結膜充血に

アイルックFX[®]

目 薬

アイルックFXの特徴

本剤は、目の充血を取り除く塩酸テトラヒドロゾリン、目のかゆみを止めるクロルフェニラミンマレイン酸塩、炎症をおさえ不快な症状を改善するグリチルリチン酸二カリウム、目の細胞の代謝を活発にし、疲れた目の機能を回復するL-アスパラギン酸マグネシウム・カリウムを配合した目薬です。

目の疲れ、目が赤い、目のかゆみ等の症状の時にお使い下さい。



目の疲れ



結膜充血

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
 - 医師の治療を受けている人
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - 次の症状のある人
はげしい目の痛み
 - 次の診断を受けた人
緑内障
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

- 次の場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
 - 目のかすみが改善されない場合
 - 5～6日間使用しても症状がよくならない場合

効能・効果

目の疲れ、結膜充血、目のかゆみ、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)、紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)、眼瞼炎(まぶたのただれ)、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかすみ(目やにの多いときなど)

使用法

1回1～3滴、1日3～6回点眼して下さい。

〈使用法に関連する注意〉

- (1)過度に使用すると、異常なまぶしさを感じたり、かえって充血を招くことがあります。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。
- (3)容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないで下さい。また、混濁したものは使用しないで下さい。
- (4)ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないで下さい。
- (5)点眼用にのみ使用して下さい。

成分・分量

本剤は、無色澄明の液で、100mL中に次の成分を含有しています。

クロルフェニラミンマレイン酸塩・・・・・・・・・・・・・・・・・・20mg
グリチルリチン酸二カリウム・・・・・・・・・・・・・・・・・・250mg
塩酸テトラヒドロゾリン・・・・・・・・・・・・・・・・・・20mg
L-アスパラギン酸マグネシウム・カリウム(等量混合物)・・・・・・2000mg

添加物：ホウ酸、ホウ砂、クエン酸Na、等張化剤、*l*-メントール、*dl*-カンフル、*d*-ボルネオール、ゲラニオール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、プロピレングリコール、エドト酸Na、クロロブタノール、濃ベンザルコニウム塩化物液50

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2)小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3)他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4)他の人と共用しないで下さい。
- (5)表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。また、使用期限内であっても、開封後は、速やかに使用して下さい。
- (6)自動車の中や暖房器具の近く等、高温(40℃以上)の所に置かないで下さい。(容器が変形することがあります)

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店
又は下記にお願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室
〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10
電 話 03(5205)8331
受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

®登録商標



販売元
第一三共ヘルスケア株式会社
東京都中央区日本橋3-14-10

製造販売元
テイカ製薬株式会社
富山市荒川一丁目3番27号

A12-06

① ② ③ ④ ⑤ ⑥
⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫