

【成分・分量】100g中  
 インドメタシン……1,000mg  
 2-メントール……3,000mg  
 添加物:ミリスチン酸イソプロピル、エタノール、ジソプロパノールアミン、エドト酸Na水和物、オキシベンゾン、パラベン、カルボキシビニルポリマー、スクワラン、アジピン酸ジイソプロピル、ハアセチルしよ糖、ポリオキシエチレンセチルエーテル

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4) 本剤のついた手で、目などの粘膜にふれないでください。
- (5) 使用期限(外箱及びチューブに記載)を過ぎた製品は使用しないでください。

# インドメタシン 1%配合

クリームタイプ

第2類医薬品

50g



刺激を抑えた  
クリームタイプ

税 控除 対象

バンダール1%クリーム  
経皮鎮痛消炎剤

西海 敬雄  
堀田 尚輝

【効能・効果】

筋肉痛、肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

【用法・用量】

1日4回を限度として適量を患部に塗擦してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 11歳以上の小児に使用させる場合は保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 11歳未満の小児には使用させないでください。
- (3) 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 外用にのみ使用してください。
- (5) 1週間当たり50gを超えて使用しないでください。
- (6) 薬剤塗擦後の患部をラップフィルムなどの通気性の悪いもので覆わないでください。
- (7) 定められた用法・用量をお守りください。

発売元

三友薬品株式会社  
 大阪市東淀川区南江口3丁目1番51号  
 製造販売元

東光薬品工業株式会社  
 東京都足立区新田2丁目16番23号

◆お問い合わせ先◆  
 お客様相談窓口 03-3855-0101

副作用被害救済制度  
 電話 0120-149-931



ここから  
開けてください

第2類医薬品

販売名 バンダール1%クリーム

この説明文書は、ご使用前に必ずお読みください。  
 また、必要な時に読めるよう保管してください。

【使用上の注意】

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないでください

- (1) 本剤または本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) ぜんそくを起こしたことがある人。

2. 次の部位には使用しないでください

- (1) 目の周囲、粘膜等。
- (2) 湿疹、かぶれ、傷口。
- (3) みずむし・たむし等または化膿して使用した患部。

3. 長期連用しないでください

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
- (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、熱感、乾燥感

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください