

第2類医薬品



漢方煎専科

# 加味逍遙散料

24

5日分10包



自然のちから、ひとに活かして

株式会社 タキザワ漢方廠

# 漢方薬 加味逍遙散料 「タキザワ」

161

## △＜使用上の注意＞



### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - (1) 医師の治療を受けている人
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
  - (3) 胃腸の弱い人
  - (4) 高齢者
  - (5) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
  - (6) 次の症状のある人  
むくみ
  - (7) 次の診断を受けた人  
高血圧、心臓病、腎臓病
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腸間膜静脈硬化症(*)	長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれる。(*)

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
下痢
4. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合場合は服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
5. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

### 【成分・分量】

トウキ	3.0g	ポタンピ	2.0g
シャクヤク	3.0g	サンシシ	2.0g
ソウジュツ	3.0g	カンゾウ	2.0g
ブクリョウ	3.0g	ショウキョウ	1.0g
サイコ	3.0g	ハツカ	1.0g
1日分(1包11.5g×2) 23.0g			

### 【効能・効果】

体力中等度以下で、のぼせ感があり、肩がこり、疲れやすく、精神不安やいらだちなどの精神神経症状、ときに便秘の傾向のあるものの次の諸症：冷え性、虚弱体質、月経不順、月経困難、更年期障害、血の道症  
(注)、不眠症

### ＜効能・効果に関連する注意＞

血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことである。

### 【用法・用量】

1日2回朝夕の空腹時に、本品1包(1回分)を和紙袋入りのまま、水約300mLを加えて半量くらいまで煎じつめ、和紙袋とともに煎じかすを除き、次の量を服用してください。

年 齢	1回量
大人(15歳以上)	全量
15歳未満	服用しないこと

※用法・用量を厳守してください。

### 【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)



4 974961 180681



製造販売元  
株式会社 **タキザワ漢方**  
さいたま市大宮区堀の内町2丁目623-1  
お客様相談室 ☎048-688-7923  
受付時間：9時～18時(月～金)

タキザワ漢方



ホームページ:takizawa.asia

副作用被害救済制度の問合せ先  
(独)医薬品医療機器総合機構

[http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_camp/index.html](http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html)

☎0120-149-931