

去痰CB錠

なかなか切れない粘稠な“たん”は安眠や安静が妨げられイライラするものです。また、のどにからまるたんやたんを伴うせきは、病中の体力を消耗させ、余病を併発することもあり、早めに処置したいものです。去痰CB錠は2つの去たん成分L-カルボシステインとブロムヘキシン塩酸塩を配合したお薬で、たん・たんのからむせきに効果を発揮します。



ご使用上の注意

してはいけないこと



[守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。]

1. 次の人は服用しないでください。

本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。

他の鎮咳去痰薬、かぜ薬

相談すること



1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師にご相談ください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 高齢者
- (4) 本人又は家族がアレルギー体質の人
- (5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (6) 次の症状のある人 高熱
- (7) 次の診断を受けた人 心臓病、肝臓病

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師にご相談ください。

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	悪心・嘔吐、食欲不振、腹痛
精 神 神 経 系	頭痛
そ の 他	血たん

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症 状 の 名 称	症 状
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の 激しい症状が、全身の皮ふ、口や目の粘膜にあらわれる。
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白 くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しき等があらわれる。*
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)等があらわれる。

(2) 3～4日間服用しても症状がよくなる場合

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師にご相談ください。

下痢、口のかわき

【効能・効果】

たん、たんのからむせき

【用法・用量】


次の量を食後に服用してください。

年 齢	1回量	服用回数
大人(15才以上)	2錠	1H3回
8才以上15才未満	1錠	
8才未満	服用しないこと	

本剤の服用により、一時的にたんの量が増えることがあります。ご心配ありません。

- 定められた用法、用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- 錠剤の取り出し方

右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押し、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。
(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)



【成分・分量】

6錠中

成 分	分 量	作 用
L-カルボシステイン	750mg	気道粘膜を正常化し、たんの流動性を高め、出しやすくします。
ブロムヘキシン塩酸塩	12mg	気道粘液の分泌を亢進させ、のどにからんだたんをうすめ、出しやすくします。

添加物としてセルロース、メタケイ酸アルミン酸Mg、CMC-Ca、ステアリン酸Mg、乳糖、トウモロコシデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース含有

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変化します。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く服用してください。

お問い合わせ先

本剤について、何かお気付きの点がございましたら、
お買い求めのお店又は下記までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

株式会社浅田館 お客様相談室

電話 03-3953-4044 (ダイヤルイン)

時間 9:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

副作用救済制度は、医薬品を正しく使用したにもかかわらず、入院を必要とする程度の副作用が生じた場合に医療費等の救済給付が行われる制度です。