

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

鎮咳去痰薬
たん、たんのからむせきに

医薬品

エフストリン®去たん錠

2つの基準外成分配合

L-カルボシステイン・プロムヘキシシ塩酸塩 ®登録商標

のどにからむたんは不快でいやなものです。また、せきをするのでからんだたんを体外へ出そうとします。エフストリン去たん錠は、そんな不快でいやなたんに効果のある医薬品です。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる。)

1. 次の人は服用しないこと
本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと
他の鎮咳去たん薬、かぜ薬



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - ① 医師の治療を受けている人。
 - ② 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - ③ 高齢者。
 - ④ 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - ⑤ 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - ⑥ 次の症状のある人。
高熱
 - ⑦ 次の診断を受けた人。
心臓病、肝臓病
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
 - ① 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振、腹痛
精神神経系	頭痛
その他	血たん

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診察を受けること。

症状の名称	症 状
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が全身の皮ふ、口や目の粘膜にあらわれる。
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しき等があらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)等があらわれる。

- ② 3～4日服用しても症状の改善がみられない場合

3. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること
下痢、口のかわき

〈効能・効果〉

たん、たんのからむせき

〈用法・用量〉

次の1回量を1日3回食後に服用してください。

年齢	15才以上	8～14才	8才未満
1回量	2錠	1錠	服用しないこと
	○ ○	○	×

本剤の服用により、一時的にたんの量が増加することがあります。

用法・用量に関連する注意

- 定められた用法・用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- 錠剤の取り出し方は右図のように錠剤の入っている PTPシートの凸部を指先で強く押し、裏面のアルミ箔を破り、取り出してから服用して下さい。
(誤ってそのまま飲み込んだりすると、食道粘膜に突きささる等思わぬ事故につながります)



〈成分・分量〉

1日量(6錠)中

成分	分量	はたらき
L-カルボシステイン	750mg	気道粘液を正常に近づけ、たんをサラサラにします。
ブロムヘキシン塩酸塩	12mg	気道分泌を高め、うすめることでたんを切ります。

添加物：セルロース、乳糖、カルメロースCa、ステアリン酸Mg、ヒドロキシプロピルセルロース、トウモロコシデンプン、メタケイ酸アルミン酸Mg

保管及び取扱上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わります)
- 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

早くよくなつていただくためのアドバイス

- 睡眠・休息を十分にとり、喫煙は控えましょう。
- 部屋の湿度を保ち暖かくすると、せきが楽になります。
- 水分を多くとると、たんが切れやすくなります。
- 外出するときはマスクも効果的です。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店又は下記にお願いいたします。

大昭製薬株式会社 おくすり相談室

電話 0748-88-4181

受付時間 9:00～17:00 (土、日、祝日を除く)

製造販売元

 **大昭製薬株式会社**

〒520-3433 滋賀県甲賀市甲賀町大原市場168