

新エスエスブロン錠エース

鎮咳去痰薬 つらいせき・たんに 去痰剤L-カルボシステイン配合

●新エスエスブロン錠エースは、せきをしずめる成分、のどにからんだたんの排出をうながす成分、息苦しさをやわらげる成分などの働きで、たんをとまなうせきにすぐれた効果をあらわします。

⚠ 使用上の注意

⊗ **してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

- ① 次の人は服用しないでください (本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。)
- ② 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください 他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、解熱鎮痛薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬)、鎮静薬
- ③ 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください (眠気があらわれることがあります。)
- ④ 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください
- ⑤ 過量服用・長期連用しないでください

👨‍⚕️ 相談すること

- ① 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 高齢者。
 - (4) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (6) 次の症状のある人。 高熱、排尿困難
 - (7) 次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、糖尿病、緑内障、肝臓病、甲状腺機能障害
- ② 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合。



関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
消化器	腹痛、悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
その他	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさがあらわれる。
皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)、中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮ふ、口や目の粘膜にあらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)等があらわれる。

- (2) 5~6回服用しても症状がよくなる場合。
- ③ 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください

口のかわき、便秘、下痢

効能・効果

せき、たん

用法・用量

次の1回量を1日3回食後に服用します。

年齢	成人(15才以上)	8才～14才	8才未満
1回量	4錠	2錠	×服用しないこと

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分と作用

成分	12錠中	作用
L-カルボシステイン	750mg	のどにからむ粘稠なたんをうすめるとともに、荒れた気道粘膜を正常化し、たんの排出をうながします。
ジヒドロコデインリン酸塩	30mg	せきの中枢に作用し、せきの発生を抑えます。
d,l-メチルエフェドリン塩酸塩	75mg	気管支筋の緊張をやわらげ、息苦しさを除くとともに、せきをしずめます。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	12mg	アレルギー性のせきをしずめます。

添加物として、CMC-Ca、無水ケイ酸、セルロース、乳糖、白糖、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒプロメロース、ポビドン、炭酸Ca、カルナウバロウ、ステアリン酸Mg、タルク、酸化チタン、プルラン、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコールを含有します。


せき・たんの治療には・・・

本剤の服用のほか、次のようなことにも気をつけましょう。

- 栄養や睡眠を十分にとって体力の回復に努めましょう。
- 室内の空気の乾燥をさげましょう。
- タバコはひかえ、またうがいなどをしてのどをいたわりましょう。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にビンのフタをよくしめて保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 本剤をぬれた手で扱わないでください。ぬれた手で扱うと、糖衣にムラができたり、変色したりすることがあります。
- (5) ビンの中のつめ物は、輸送中に錠剤が破損するのを防ぐためのものです。開封後は不要となりますので取り除いてください。
- (6) 使用期限をすぎたものは服用しないでください。



お問い合わせ先

お買い求めのお店、又はお客様相談室にお問い合わせください。
エスエス製薬株式会社 お客様相談室 ☎0120-028-193
受付時間：9時から17時30分まで（土、日、祝日を除く）

製造販売元



エスエス製薬株式会社

〒103-8481 東京都中央区日本橋浜町2-12-4
<http://www.ssp.co.jp/>