

この注意書は服用前に必ずお読みください
また、必要時に読めるよう保管しておいてください

1才から大人までのかぜ薬

カゼロンゴールド顆粒 第②類医薬品

製品の特徴

カゼロンゴールドは顆粒状のみやすいかぜ薬です。

各成分が協力的に働くよう、合理的に配合されていますので鼻水、鼻づまり、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛などのかぜの「諸症状」に効果的に作用します。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる。)

- 次の人は服用しないこと。
 - (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
 - (3) 1歳未満の乳児。
- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと。
他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等
(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)
- 服用後、乗り物又は機械類の運転操作をしないこと。(眠気等があらわれることがある)
- 服用前後は飲酒しないこと。 5. 長期連用しないこと。

🗨 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
 - (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 水痘(水ぼうそう)若しくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある乳・幼・小児。(15才未満)
 - (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (5) 次の症状のある人。…高熱、排尿困難 (6) 次の診断を受けた人。…心臓病、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症 状	関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ	泌 尿 器	排 尿 困 難
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振	そ の 他	過度の体温低下
精 神 神 経 系	めまい		

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状	症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる	間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする
皮膚粘膜眼症候群 (ステvensジョンソン症候群、 中毒性表皮壊死融解症)	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤等が持続したり、意欲に悪化する	ぜんそく	息をすすとゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる	無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。 口のかわき、眠気
- 5～6回服用しても症状が良くならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

● [効能・効果]

かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和。

● [用法・用量]

年 令	1 回服用量	1 日服用回数
15才以上	1 回 1 包	3 回
11才～14才	1 回 2/3包	
7才～10才	1 回 1/2包	
3才～6才	1 回 1/3包	
1才～2才	1 回 1/4包	

- 1日3回食後30分以内に水又は白湯にて服用する。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- 2歳未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させること。

● [成分・分量] 1日量(3包)中

成 分	含 量	働 き
アセトアミノフェン	600 mg	熱を下げ痛みを抑えます。
エテンザミド	500 mg	熱を下げ痛みを抑えます。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5 mg	鼻水、鼻づまりなどのアレルギー症状をおさえます。
クエン酸チペピジン	45 mg	痰をやわらかく出します。
グアイフェネシン	150 mg	痰の粘度を低下させ、痰を出やすくします。
無水カフェイン	150 mg	関節の痛みや頭痛をやわらげます。

なお、添加物として、桂皮末、甘草末、バレイショデンブン、D-マンニトール、カルメロースCa、ヒドロキシプロピルセルロース、香料を含有する。

● 保管および取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の折り返しを折り返して保管し2日以内に服用してください。
- (4) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わる)
- (5) 配置期限を過ぎた製品は使用しないでください。

※ 本製品のお問い合わせは、配置員又は下記までお願いします。

製造販売元 **太陽堂製薬株式会社** お客様相談室
〒635-0153 奈良県高市郡高取町下土佐578
電話 0744-52-2174(受付時間 8:30～17:00 土・日祝を除く)

副作用被害救済制度：0120-149-931