

タキザワの

漢方煎薬

第2類医薬品

5日分15包
87

六味丸料「タキザワ」



株式会社タキザワ漢方廠

漢方薬 六味丸料「タキザワ」

15H

△<使用上の注意>

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 胃腸が弱く下痢しやすい人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
消化器	食欲不振、胃部不快感、腹痛
3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
下痢
4. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【成分・分量】	
ジ オ ウ	5.0 g
タ ク シ ャ	3.0 g
サンシユウ	3.0 g
ブクリョウ	3.0 g
サンヤク	3.0 g
ボタンピ	3.0 g
1日分 (1包6.67g×3)	20.0 g

【効能・効果】
体力中等度以下で、疲れやすくて尿量減少又は多尿で、ときに手足のほてり、口渴があるものの次の諸症：排尿困難、残尿感、頻尿、むくみ、かゆみ、夜尿症、しびれ

【用法・用量】
1日3回食間あるいは食前の空腹時に、本品1包(1回分)を和紙袋入りのまま、水約200mLを加えて半量ぐらいまで煮つめ、和紙袋を除き、次の量を服用してください。

年 齢	1回量
成人 (15歳以上)	全量
15歳未満 7歳以上	成人の2/3
7歳未満 4歳以上	成人の1/2
4歳未満	服用しないこと

〈用法・用量に関連する注意〉

1. 用法・用量を厳守してください。
2. 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【保管及び取扱い上の注意】

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)



4 974961 100115

製造販売元

株式会社 タキザワ漢方
さいたま市見沼区片柳412-1
お客様相談室☎048-688-7923
受付時間:9時~18時(月~金)



タキザワ漢方

検索

ホームページ:takizawa.asia

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

■ 0120-149-931

