

# くりかえす皮フ炎・かゆみ治療薬

メンソレータム®



**APソフト**  
I. 治療用

つらい湿疹・皮フ炎・  
かゆみによく効きます

体質的に湿疹ができやすい方、乾燥によって皮フのバリアがこわれ、外部刺激によって炎症や湿疹が起きやすい方など、湿疹・皮フ炎に悩まれている方へ・・・。  
メンソレータムAPソフトローションは、くり返す湿疹・皮フ炎のために、治療効果・安全性に加え、保湿力・使用感にもこだわった治療薬です。



## つらいかゆみをしっかり鎮める

炎症・かゆみによく効いて体内に入ると分解する  
アンテドラッグ型のステロイド配合。

## 高い保湿力が長時間持続

ワセリンが肌を覆って軟膏のような高い  
保湿力が持続。乾燥性の皮フ炎におすすめです。

## よくのびてべたつかない

やさしくぬりのばせる乳液。高圧乳化技術により、  
しっとりするのにべたつかないぬり心地を実現しました。

● ● ● 低刺激性タイプ ● ● ●

### このようなときにおすすめです

- 乾燥性の皮フ炎
- ひじ・ひざの内側などの湿疹
- 腕・脚・背中などの湿疹
- がまんできないかゆみ



### 1 少量ずつこまめにぬる

少量ずつこまめにぬりましょう。  
1度に大量にまとめぬりしても効果  
があがるものではありません。

### 3 しっかり保湿する

症状がよくなってきた部位には保湿  
剤を使うなど、薬と保湿剤を上手に  
使い分けましょう。また、治った後も  
湿疹症状の再発を防ぐためにはしつ  
かり保湿ケアをすることが大切です。

### 2 徐々に使用回数を減らす

症状が治まってきたら使用回数を  
徐々に減らしていきましょう。

- 症状のない部位にはご使用にならないで  
ください。
- こまめにぬっても症状がよくならない、  
湿疹等の症状が治ってもはれや痛みがある、  
慢性的に症状をぶり返す等の場合は  
医師へのご相談をおおすすめします。

治療のコツ

### 〈メンソレータムAPソフトシリーズ〉 保湿用

メンソレータムAPソフトシリーズには薬用保湿ローションもございます

湿疹や皮フ炎が治った後の保湿ケアにおすすめです。

[皮フの乾燥・肌あれを防ぐ]

医薬部外品



使用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう保管してください。

## メンソレータム®APソフトローション 第Ⅱ類医薬品 皮フ炎・かゆみ治療薬

### 使用上の注意

#### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起りやすくなる)

1. 次の部位には使用しないでください。

- (1) 水痘(水ぼうそう)、水虫・たむし等または化膿している患部
- (2) 目や目の周囲、口唇などの粘膜の部分等

2. 顔面には広範囲に使用しないでください。

3. 長期運用しないでください。

#### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師または薬剤師にご相談ください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦または妊娠していると思われる人
- (3) 本人または家族がアレルギー体質の人
- (4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (5) 患部が広範囲の人
- (6) 湿潤やただれのひどい人

2. 次の場合は直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師または薬剤師にご相談ください。

(1) 使用後、次の症状が現れた場合

関係部位	症 状
皮フ	発疹・発赤、かゆみ
皮フ (患部)	水虫・たむし等の白癬症、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

(2) 5~6日間使用しても症状がよくならない場合

■効能・効果 湿疹、皮フ炎、かぶれ、虫さされ、かゆみ、あせも、じんましん

■用法・用量 1日数回、適量を患部にぬってください。

●必ず振ってからご使用ください。

#### [用法・用量に関する注意]

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 目に入らないようご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 外用にのみご使用ください。
- (5) ラップフィルム等の通気性の悪いものでおおわないでください。

#### ■成分・分量(1g中)

吉草酸酢酸ブレドニゾロン(アンテドラッグステロイド) ..... 1.5mg

添加物として、グリセリン、ワセリン、水素添加大豆リノ脂質、キサンタンガム、パラベン、クエン酸Na、クエン酸、N-(ヘキサデシロキシヒドロキシプロピル)-N-ヒドロキシエチルヘキサデカナミドを配合する。

#### ■保管及び取扱上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。

#### お問い合わせ先: お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などを  
お聞かせいただけませんか。「あなたに応えたい」サポートデスクです。

**東京:03-5442-6020 大阪:06-6758-1230**

受付時間 9:00~18:00(土、日、祝日を除く)

 **ROHTO** ロート製薬株式会社

大阪市生野区巽西1-8-1

400735603