

この説明文書は、お薬とともに保管し、服用の際にはよくお読みください。

総合かぜ薬

カイゲン感冒カプセルDX

第②類医薬品

カイゲン感冒カプセルDXは、アセトアミノフェン、d-クロルフェニラミンマレイン酸塩、dl-メチルエフェドリン塩酸塩などのかぜの諸症状を緩和する成分に加えて、消炎酵素剤であるリゾチーム塩酸塩と、のどのはれと痛みの発生を抑えるトラネキサム酸、胃粘膜保護成分であるグリシンを同時に配合した、胃にもやさしい総合かぜ薬です。

⚠️ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください
(1) 本剤又は鶏卵によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
(2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください
他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬)、トラネキサム酸を含有する内服薬(鼻炎用内服薬、歯科口腔用薬)
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください
(眠気があらわれることがあります。)
4. 服用時は飲酒しないでください
5. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください
(1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 授乳中の人。
(4) 高齢者。
(5) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
(6) 薬によりアレルギー症状やぜんそくを起こしたことがある人。
(7) 次の症状のある人。
高熱、排尿困難
(8) 次の診断を受けた人。
甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障、血栓のある人(脳血栓、心筋梗塞、血栓静脈炎等)及び血栓症を起こす恐れのある人
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振、胃部不快感、胃痛、口内炎、胸やけ
精神神経系	めまい
その他	排尿困難

まれに次の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。

(裏面もお読みください。)

皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮ふ、口や目の粘膜にあらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)等があらわれる。
間質性肺炎	空せき(たんを伴わないせき)を伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。(これらの症状は、かぜの諸症状と区別が難しいこともあり、空せき、発熱等の症状が悪化した場合にも、服用を中止するとともに、医師の診療を受けること。)
ぜんそく	

(2) 5~6回服用しても症状がよくなる場合

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください
口のかわき、下痢

効能・効果

かぜの諸症状(のどの痛み、鼻水、鼻づまり、くしゃみ、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

用法・用量

次の量を、食後なるべく30分以内に水又はお湯と一緒に服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15才以上)	2カプセル	3回
7才以上15才未満	1カプセル	
7才未満	服用させないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) カプセルの取り出し方

右図のようにカプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。
(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)




成分・分量 6カプセル(成人1日量)中

成分	分量	はたらき
アセトアミノフェン	900mg	熱を下げ、痛みをやわらげます。
リゾチーム塩酸塩	60mg(力価)	鼻・のどの炎症をしずめ、たんのきれも良くします。
トラネキサム酸	420mg	粘膜の炎症を抑え、のどの痛みを改善します。
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	3.5mg	鼻水、鼻づまり、くしゃみなどの症状をやわらげます。
チペピジンヒベンズ酸塩	75mg	非麻薬性の鎮咳去痰薬で、せきをしずめ、たんを出しやすくします。
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	60mg	気管支をひろげ、せきをしずめます。
カフェイン水和物	75mg	熱や痛みをとる成分のはたらきを補助します。
チアミンジスルフィド(ビタミンB ₁)	10mg	かぜの際に不足しがちなビタミンB ₁ を補給します。
リボフラビン(ビタミンB ₂)	6mg	発熱時に不足しがちなビタミンB ₂ を補給します。
グリシン(アミノ酢酸)	240mg	解熱鎮痛成分による胃への負担をやわらげ、胃をやさしく守ります。

添加物としてセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、リン酸水素Ca、ゼラチン、黄色4号(タートラジン)、黄色5号、ラウリル硫酸Naを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 外箱に表示の使用期限が過ぎた製品は服用しないでください。



お問い合わせ先

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、又は下記にお願い申し上げます。

株式会社カイゲン お客様相談室 電話06-6202-8911
受付時間:9:00~17:00(土曜、日曜、祝日を除く)

発売元 **株式会社カイゲン**
大阪市中央区道修町2丁目5番14号

製造販売元 **第一薬品工業株式会社**
富山市草島15番1