

**この説明書は、ご使用前に必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。**

### 総合感冒薬

# ワン

#### ⚠ 使用上の注意

#### ❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

#### 1. 次の人は服用しないでください

- (1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。

#### 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬)

#### 3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください

(眠気があらわれることがあります。)

#### 4. 服用時は飲酒しないでください

#### 5. 長期連用しないでください

#### 🗨 相談すること

#### 1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 授乳中の人。
- (4) 高齢者。
- (5) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (6) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (7) 次の症状のある人。  
高熱、排尿困難
- (8) 次の診断を受けた人。

甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障

#### 2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください

#### (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
その他	排尿困難

まれに次の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

(裏面もお読みください。)

症状の名称	症 状
シ ョ ッ ク (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しき等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しき等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮ふ、口や目の粘膜にあらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)等があらわれる。
間質性肺炎	空せき(たんを伴わないせき)を伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。(これらの症状は、かぜの諸症状と区別が難しいこともあり、空せき、発熱等の症状が悪化した場合にも、服用を中止するとともに、医師の診療を受けること。)
ぜんそく	

(2)5~6回服用しても症状がよくなる場合

3. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください

□のかわき

#### 効能・効果

かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

#### 用法・用量

次の量を、1日3回、食後なるべく30分以内に服用してください。

年 齢	1回量
成人 (15才以上)	4錠
7才以上15才未満	2錠
5才以上7才未満	1錠
5才未満	服用させないこと

(用法・用量に関連する注意)

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

#### 成分・分量 12錠(成人1日量)中

成 分	分 量
アセトアミノフェン	900mg
マレイン酸クロルフェニラミン	7.5mg
フェンジゾ酸クロペラスチン	60mg
dl-塩酸メチルエフェドリン	45mg
グアヤコールスルホン酸カリウム	90mg
無水カフェイン	180mg

添加物としてトウモロコシデンプン、乳糖、セルロース、無水クイ酸、ポリドン、クロスカルメロースNa、タルク、ステアリン酸Mg、白糖、フマル酸、ステアリン酸、ポリビニルピロリドン、ジエチルアミノアセート、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ゼラチン、アラビアゴム、炭酸Ca、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、酸化チタン、カルナウバロウを含有します。

#### 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (5)表示の期限を過ぎたものは服用しないでください。

#### お問い合わせ先

くすり相談窓口：(076)435-5055  
午前9時から午後4時30分まで  
(土、日、祝日を除く)

製造販売元 **第一薬品工業株式会社**  
富山市草島15-1