

チクナイン

項目	内容															
医薬品区分	一般用医薬品															
薬効分類	辛夷清肺湯															
承認販売名																
製品名	チクナイン															
製品名(読み)	チクナイン															
製品の特徴																
使用上の注意	<p>■相談すること</p> <p>1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること</p> <p>(1) 医師の治療を受けている人</p> <p>(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人</p> <p>(3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)</p> <p>(4) 胃腸虚弱で冷え症の人</p> <p>2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること</p> <table border="1" data-bbox="517 1003 1449 1070"> <thead> <tr> <th>関係部位</th> <th>症 状</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>消化器</td> <td>食欲不振、胃部不快感</td> </tr> </tbody> </table> <p>まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること</p> <table border="1" data-bbox="517 1173 1449 1464"> <thead> <tr> <th>症状の名称</th> <th>症 状</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>間質性肺炎</td> <td>階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする</td> </tr> <tr> <td>肝機能障害</td> <td>発熱、かゆみ、発疹、黄だん(皮ふや白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる</td> </tr> <tr> <td>腸間膜静脈硬化症</td> <td>長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれる</td> </tr> </tbody> </table> <p>3. 1ヶ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること</p> <p>4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること</p>	関係部位	症 状	消化器	食欲不振、胃部不快感	症状の名称	症 状	間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする	肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄だん(皮ふや白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる	腸間膜静脈硬化症	長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれる			
関係部位	症 状															
消化器	食欲不振、胃部不快感															
症状の名称	症 状															
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする															
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄だん(皮ふや白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる															
腸間膜静脈硬化症	長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれる															
効能・効果	体力中等度以上で、濃い鼻汁が出て、ときに熱感を伴うものの次の諸症： 鼻づまり、慢性鼻炎、蓄膿症(副鼻腔炎)															
効能関連注意																
用法・用量	<p>次の量を朝夕、食前又は食間に水又はお湯で服用してください</p> <table border="1" data-bbox="517 1890 1449 2078"> <thead> <tr> <th>年 齢</th> <th>1回量</th> <th>服用回数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>大人(15才以上)</td> <td>1包</td> <td rowspan="4">1日2回</td> </tr> <tr> <td>7才以上15才未満</td> <td>2/3包</td> </tr> <tr> <td>4才以上7才未満</td> <td>1/2包</td> </tr> <tr> <td>2才以上4才未満</td> <td>1/3包</td> </tr> <tr> <td>2才未満</td> <td colspan="2">× 服用しないこと</td> </tr> </tbody> </table>	年 齢	1回量	服用回数	大人(15才以上)	1包	1日2回	7才以上15才未満	2/3包	4才以上7才未満	1/2包	2才以上4才未満	1/3包	2才未満	× 服用しないこと	
年 齢	1回量	服用回数														
大人(15才以上)	1包	1日2回														
7才以上15才未満	2/3包															
4才以上7才未満	1/2包															
2才以上4才未満	1/3包															
2才未満	× 服用しないこと															

用法関連注意	(1)定められた用法・用量を厳守すること (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること ●食間とは「食事と食事の間」を意味し、食後約2～3時間のことをいいます										
成分分量	1日量(2包:4.6g)中 辛夷清肺湯エキス・・・2.5g <table border="0" style="margin-left: 40px;"> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 10px;">シンイ・・・1.5g</td> <td>チモ・・・1.5g</td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 10px;">ビャクゴウ・・・1.5g</td> <td>オウゴン・・・1.5g</td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 10px;">サンシシ・・・0.75g</td> <td>バクモンドウ・・・3.0g</td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 10px;">セッコウ・・・3.0g</td> <td>ショウマ・・・0.75g</td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 10px;">ビワヨウ・・・0.5g</td> <td style="text-align: right;">より抽出</td> </tr> </table>	シンイ・・・1.5g	チモ・・・1.5g	ビャクゴウ・・・1.5g	オウゴン・・・1.5g	サンシシ・・・0.75g	バクモンドウ・・・3.0g	セッコウ・・・3.0g	ショウマ・・・0.75g	ビワヨウ・・・0.5g	より抽出
シンイ・・・1.5g	チモ・・・1.5g										
ビャクゴウ・・・1.5g	オウゴン・・・1.5g										
サンシシ・・・0.75g	バクモンドウ・・・3.0g										
セッコウ・・・3.0g	ショウマ・・・0.75g										
ビワヨウ・・・0.5g	より抽出										
添加物	ヒドロキシプロピルセルロース、二酸化ケイ素、乳糖										
保管及び取扱い上の注意	(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること (2)小児の手の届かない所に保管すること (3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる) (4)1包を分割して服用する場合、 残った薬剤は袋の口を折り返して保管すること また、保管した残りの薬剤は、その日のうちに服用するか捨てること										
消費者相談窓口	発売元 小林製薬株式会社 〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10 製品のお問合せ先(お客様相談室) 0120-5884-01 9:00～17:00(土・日・祝日を除く)										
製造販売会社	製造販売元 小林製薬株式会社 〒567-0057 大阪府茨木市豊川1-30-3										
販売会社											
剤形	その他										
リスク区分等	第2類医薬品										